

v.15 - v.16

五

5

增廣本草綱目



卷之五十五



本草綱目草部第十五卷

草之四

隰草類上五十三種

菊 本經

野菊 拾遺

菴蘭 本經 對廬附

著 本經

艾 別錄 夏臺附

千年艾 綱目

茵陳蒿 本經

青蒿 本經

黃花蒿 綱目

白蒿 本經

角蒿 唐本

陳蒿 拾遺

馬先蒿 本經

陰地蕨 圖經

牡蒿 別錄

九牛草 圖經

莞蔚 本經即 益母草

盤翬 拾遺

微蘄 本經 無 心草附

夏枯草 本經

劉寄奴草 唐本

曲節草 圖經即 六月霜

麗春草 圖經

旋覆花 本經

青葙子 本經 陶朱術鴈來紅 天靈草思童子附

雞冠花 嘉祐

紅藍花 開寶

番紅花 綱目

燕脂 綱目

大蓂小蓂 別錄

續斷 本經

苦蕒 別錄

漏蘆 本經

飛廉 本經

苧麻 別錄

苧麻 唐本 即白麻

大青 別錄

小青 圖經

胡盧巴 嘉祐

龜寶 本經 即馬蘭子 必似勒附



惡實別錄  
即牛蒡子

葦本經  
即蒼耳

天名精本經  
即地菰

鶴虱唐本草

狶薺唐本草

箬綱目

蘆別錄

甘蕉別錄

蘘荷別錄

麻黃本經  
雪花草附

木賊嘉祐  
問荆附

石龍芻本經即  
龍須草

龍常草別錄  
即糴心草

燈心草開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六



本草綱目草部第十五卷

草之四

隱草類上五十三種

菊

本經釋名節華女節別女華女望別日精別更生別傳延年別治膳爾金蓋目陰成別錄時珍曰按陸佃律云菊本作菊上品釋名節華女節別女華女望別日精別更生別傳延年別治膳爾金蓋目陰成別錄時珍曰按陸佃律云菊本作菊

至此而窮盡故謂之菊節華之名亦取其應節候也崔寔月令云女節女華菊花之名也治膳日精菊根之名也抱朴子云仙方所謂日精更生周益皆一菊而根莖花實之名異也頌曰唐天寶單方圖載白菊云原生南陽山谷及田野中潁川人呼為回峰菊汝南名茶苦蒿上黨及建安郡順政郡並名集解別錄曰菊花生雍州川澤及田野正月采根三月采葉五月采莖九月采花十一月采實時陰乾

羊散草河內又名地微蒿者景曰菊有兩種一種莖葉氣香而味甘葉可作羹食者為真菊一種青莖而大作蒿又氣味苦不堪食者名苦蕒非真菊也葉正相似惟以甘苦別之南陽縣最多今近道處處有之取種便得又有白菊莖葉都相似惟花自五月取之仙經以菊為妙用但難多得宜常服之臧器曰白菊生平澤五月花紫白色頌曰處處有之以南陽菊渾者為佳初春布地生細苗夏茂

秋花冬實然種類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微大味甚甘者為真其莖青而大葉細氣烈似蒿又花小味苦者名苦蕒非真也南陽菊亦有兩種白菊葉大如艾葉莖青根細花白莖黃其黃菊葉似蒿蒿花莖都黃令服辟家多用白者又有一種開小小花辦下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦皆佳藥類曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄九月應候而開者是也

鄧州白菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用瑞曰花大而香者為甘菊花小而黃者為黃菊花小而氣惡者為野菊花時珍曰菊之品凡百種宿根自生莖葉花色品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜亦不能盡收也其莖有株莖葉赤青綠之殊其葉有大小厚薄失壳之異其花有千葉單葉有心無心有子無子黃白紅紫間色深淺大小之別其味有甘苦辛之辨又有真菊秋菊冬菊之別大抵惟以單葉者味甘入藥菊譜所載甘菊鄧州黃鄧州白者是矣甘菊始生于山野今則人皆栽植之其花細碎品不甚高蓋如蜂窠者中有細子亦可採種嫩葉及花皆可煉食白菊花稍大味不甚甘亦秋月采之菊之無子者謂之牡菊燒灰撒地中能化蟲說固出自周禮也

花葉根莖氣味草無毒別錄曰甘損之曰甘者入藥苦者不入藥景曰苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊花味甘苦別實並同錄言菊花味甘諸家以甘者為菊苦者為苦蕒惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦蕒者爾故景煥牧豎閑談云真菊延齡野菊泄



人正如黃精益壽鉤吻殺人之意之  
才曰木及枸杞根桑根白皮為之使  
**主治**諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年  
本經療腰痛去來

**陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢**  
陶繖緩貌  
**治頭目風熱風旋倒地體骨疼痛身上一切游風令消散利血脉並無所忌**  
根作枕

**明目葉亦明目生熟並可食**  
明大  
**養目血去翳膜**  
元  
**主肝氣不足**  
好古

**白菊氣味苦辛平無毒**  
**治風眩能令頭不白**  
弘景  
**紫髭髮令重和巨勝茯苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色**  
藏發明  
藥考曰黃

與水有金與火能補陰血故養目時珍曰菊者生夏茂秋花冬實備受四氣飽經霜露葉枯不落花稿不零味兼甘苦性稟平和普人謂其能除風熱益肝補陰蓋不知其得金水之精英尤多能益金水二臟也補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除用治諸風頭目其旨深微黃者入金水陰分白者入金水陽分紅老行婦人血分皆可入藥神而明之存乎其人其苗可蔬葉可啜花可餌根實可藥囊之可枕釀之可飲自本至末固不有功宜乎前賢比之君子神農列之上品隱士采入酒尊騷人餐其落英費長房言九日飲菊酒可以辟不祥神仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙荆州記言湖廣久病風羸飲菊潭水多壽菊之貴重如此是豈尋芳可伍哉鍾會菊有五美贊云圓花高懸準天極也絀黃不雜后土色也早植晚發君子德也冒霜吐穎象貞實也益中體輕神仙食也○西京雜記言采菊花葉葉雜秫米

釀酒至次年九月始熟用之  
十六  
**服食甘菊**  
王由方云王子喬變白增年方用甘菊三月上寅日采菊名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月上寅日采花名曰金精十二月上寅日采根莖名曰長生四末並

陰乾五日取等分以成日合搗杵為末每酒服一錢七或以蜜丸梧子大酒服七丸一日三服百日輕潤一年髮白變黑服之二年齒落再生五年八十歲老翁變為兒童也玉說云正月采葉五月五日采莖九月九日采花  
**服食白菊**  
太清靈寶方引九月九日

白菊花二斤茯苓一斤並搗羅為末每服二錢溫酒調下日三服或以凍過松脂和丸雞子大每服一丸  
**白菊花酒**  
天寶單方治丈夫婦人久患頭風眩悶頭

主頭眩久服令人好顏色不老藏器曰抱朴子言劉生丹法用白菊汁蓮花汁地血汁糟汁和丹蒸服也  
**白菊花酒**  
人久患頭風眩悶頭

髮乾落胸中痰壅每發即頭旋眼昏不覺倒者是其候也先灸兩風池各二十七壯并服此酒及散永瘥其法春末夏初收白菊軟苗陰乾持末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再服漸加三方寸匕若不飲酒者但和羹粥汁服亦得秋八月合花收暴乾初取三大斤以生絹袋盛貯三大斗酒中經七日服之日

三次常令酒氣相續為佳  
**蘇頌圖經**  
**風熱頭痛**  
菊花石膏川芎各三錢為末每服一錢半茶調下簡便方  
**膝風疼痛**  
菊花陳艾葉作護膝久則自除也  
**癰疽入目**  
生醫障用

生絹袋盛貯三大斗酒中經七日服之日三次常令酒氣相續為佳  
**蘇頌圖經**  
**風熱頭痛**  
菊花石膏川芎各三錢為末每服一錢半茶調下簡便方  
**膝風疼痛**  
菊花陳艾葉作護膝久則自除也  
**癰疽入目**  
生醫障用

生絹袋盛貯三大斗酒中經七日服之日三次常令酒氣相續為佳  
**蘇頌圖經**  
**風熱頭痛**  
菊花石膏川芎各三錢為末每服一錢半茶調下簡便方  
**膝風疼痛**  
菊花陳艾葉作護膝久則自除也  
**癰疽入目**  
生醫障用



白菊花穀精草綠豆皮等分為末每用一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候汁盡食柿日食三枚淺者五七日遠者半月見効  
**病後膏** 白菊花蟬脫等分為散每用二三錢入蜜少許水煎服大人小兒皆宜屢驗  
**急救方** 疔腫

煮候汁盡食柿日食三枚淺者五七日遠者半月見効  
**見仁齋直指方**  
**毒死** 菊花一握搗汁一升入口即活此神驗方也冬月採根 肘后方  
**女人陰腫** 甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗 危氏得効方  
**酒醉不醒** 九月九日真菊花為末飲服方寸匕 外臺秘要  
**眼目昏花** 雙美丸用甘菊一斤紅椒去

目六兩為末用新地黃汁和丸梧子大每服五十丸臨卧茶清下 瑞竹堂方

**花上水** 主治色壯陽治一切風大明

**野菊** 拾釋曰薏乃蓮子之心此集解藏器曰苦薺生澤畔莖如馬蘭花如菊菊甘而薺苦語曰苦如薺是也時珍曰苦薺這釋名薺薺物味苦似之故與之同名  
**集解** 處處原野極多與菊無異但葉薄小而多尖花小而莖多如蜂窠狀氣味苦辛慘烈

**根葉莖花氣味苦辛溫有小毒** 震亨曰野菊花服之大傷胃氣  
**主治** 調中止洩破血婦人腹內宿血宜之  
**治癰腫疔毒瘰癧瘰癧** 時珍附方新

**癰導腫** 一切無名腫毒孫氏集効方用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以渣傳之即愈  
**衛生易簡方** 用野菊花葉葉蒼耳草各一握共搗入隨用酒一梳絞汁服以渣傳之取汗即愈或六月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花為末每酒服用三錢亦可

**天泡濕瘡** 野菊花根葉木煎湯洗之 醫學集成  
**瘰癧未破** 野菊花搗爛煎酒服以渣傳之自消不消亦自破也瑞竹堂經驗方

**蒼蘭** 音淹蘭 釋名覆蘭 時珍曰蒼草堂也蘭里門也此草乃蒿屬老莖可以蓋覆蒼蘭故以名之  
**集解** 別錄曰蒼蘭子生雍州川谷亦本經上品  
**貞元廣利方** 謂之蒼蘭蒿云又史注云蒼蘭軍行宿室也則蘭似當作虞  
**生上黨及道邊** 十月采實陰乾

弘景曰狀如蒿艾之類近道處處有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也  
**頌曰** 今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七月開花八月結實九月采實時珍曰蒼蘭葉不似艾似菊葉而薄多細了面背皆青高者四五尺其莖白色如艾實中有細子極易繁衍藝花者以之接

菊

**子氣味苦微寒無毒** 別錄曰微溫普曰神農雷公桐君歧伯苦小溫無毒李杲溫權曰辛  
**主治** 五臟瘀血腹中水氣臃脹留熱風寒濕痺  
**苦時珍曰** 降也陰中微陽入足厥陰經血分才曰刺實兼以為之使



本草綱目  
卷十五

身體諸痛久服輕身延年不老經本療心下堅隔中寒熱周痺婦人月水不通消食明目驅驢食之神仙別錄益氣主男子陰痿不起治心腹

脹滿腰膝重痛膀胱痛及骨節煩痛不下食  
大 搗酒飲治門挫腰痛及婦人產後血氣痛  
時 發明頌曰本經云久服輕身不老而古  
珍 少有服食者惟人諸雜治藥中如胡

治治驚邪狸骨凡之麋大方中用之孫思邈千金翼雷圭獨行方主跪拆瘀血並單用菴蘭者汁服亦可求服今人治打撲多用此法或飲或散其效最速時珍曰曼普本草及名醫別錄並言驅驢食菴蘭神仙此亦謂其多毒爾驢驢及獸名似蝶而小前足長後足短不能

自食負癭鼠瘻  
為之齧食云  
附方  
新二癰血不散  
變成癰腫生甚  
蘭蒿搗汁一升服之  
廣利方  
月水不通  
婦人宿有風冷  
留血積聚月水  
不通者蘭子一  
升桃仁二升酒  
浸皮炙研勻入  
瓶內以酒二斗  
浸封五日後每  
飲三合日三服  
惠方

產後血痛 菴蘭子一兩水一升童子小便二盃煎服 頭湖集問方 附錄對虛 別錄有名未用曰味苦寒無毒生疥瘡久不  
廖生死肌除大熱者汁洗之似菴蘭八月采

著

音尸 本集解 鮮珍曰按班固白虎通載孔子云著之為言者也老人應年多更事久事能盡知也  
陸佃雅云草之多壽者故字從耆博物志言著千歲而三百莖其本老故知吉壽  
別錄曰著實生少室山谷八月九月采實日乾恭曰此草所在

集解 別錄曰著實生少室山谷八月九月采實日乾恭曰此草所在

有之其莖可爲笙陶氏誤以楮實爲之楮實味甘此味苦今正之頌曰今蔡州上蔡縣白龜岡旁其生如蒿作叢高五六尺一本二十

莖至多者五十莖生便絲條直所以異於眾蒿也秋後有花出於株端紅紫色形如菊花結實如艾實史記龜策傳云龜千歲乃遊於蓬萊之上著百莖共一根所生之處默無虎狼蟲毒螫徐廣註云龜千歲而靈著百莖而一本生日莖也褚先生云著滿百莖其葉之上著百莖共一根所生之處默無虎狼蟲毒螫徐廣註云龜千歲而靈著百莖而一本生日莖也褚先生云著滿百莖其

下必有神龜守之上則常有青雲覆之傳云天下和平王道得而蒼莖長大其叢生滿百莖方今取著者八十莖已上長八尺者即已難得但得滿六十莖以上長六尺者即可用矣今蔡州所上莖不言如此則此類亦神物故不常有也時珍曰蒼莖乃蒿屬神草也故易曰

之德國而神天子著長九尺諸侯七尺丈夫五尺士三尺張華博物志言以末大於本者為主次蒿次荆以月望日浴之然則無著標卦亦可以荆

蒿代之矣

實氣味苦酸平無毒主治益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老輕身

經本

葉主治瘧疾附方新腹中痞塊 著葉獨蒜穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量痞大小貼之兩炷香為度其痞化為膿血從大便出 劉松石保壽堂方



艾別錄釋名臺爾雅艾蒿時珍曰王安石字說云艾可入疾久而彌善故字從陸佃卿雅云博物志言割冰分圓舉而向中品釋名艾蒿時珍曰王安石字說云艾可入疾久而彌善故字從陸佃卿雅云博物志言割冰分圓舉而向

為法集解別錄曰艾葉生田野三月三日采暴乾頌曰處處有之以復道及四明者為佳云此種灸百病尤勝初生布地生苗莖類蒿葉也背曰以苗短者為良三月三日五月五日采葉暴乾陳久方可用時珍曰艾葉本草不著土產但云生田野宋時以湯陰道

者為佳四明者圖形近代惟湯陰者謂之北艾四明者謂之海艾自成化以來則以新州者為勝用充物天下重之謂之新艾相傳他處艾火酒壘不能透斷艾一灸則直透徹為異也此草多生山原二月宿根生苗成叢其莖直生白色高四五尺其葉四布狀如蒿分為

五尖極上復有小尖面青背白有茸而柔厚七八月葉間出穗如車前穗細花結實累累盈枝中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈去暴乾收葉先君月池子諱言聞嘗著新艾傳一卷有讚云產於山陽采以端午治病灸功非小補又宗懔荆楚歲時記云五月五

日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之收以灸病甚驗是日采艾為人懸於戶上可禱毒氣其莖乾之染麻油引火點灸疔瘡潰爛至愈不瘳亦可代著策及作燭心

落葉修治宗奭曰艾葉乾搗去青澤取白入石硫黃末少許謂之硫黃艾灸家用之得米粉少許搗為末入服食藥用時珍曰用艾葉須陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾灸火則傷人臍臑孟子云七年之病求三年之艾揀去塵屑選取淨葉入石臼內水杵搗

熟羅去渣滓取白者再搗至柔爛如綿為度用時焙燥則灸火得力入婦人丸散須以熟艾用醋煮乾搗成餅子烘乾再搗為末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若入白茯苓三五片同碾共在一處即時可以作為細末亦一奇異事也

氣味苦微溫無毒恭曰生寒熱熱元素曰苦溫陰中之陽時珍曰苦而辛生溫熱主治灸百病可作煎止吐血下痢下部腫瘡婦人漏血熱可升可降陽也入足大陰厥陰少陰之經苦酒香附為之使

利陰氣生肌肉辟風寒使人有子作煎勿令見風別錄搗汁服止傷血殺蛇蟲弘景主血下血膿血痢水瘰癧及丸散任用恭止崩血腸痔血

搗金瘡止腹痛安胎苦酒作煎治癰甚良搗汁飲治心腹一切冷氣鬼氣甄權治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱大明治帶脉為病腹脹滿腰溶

溶如坐水中好溫中逐冷除濕時珍發明說曰春月米嫩艾作菜食或和麵作饅饅如彈子吞三五枚以飯壓之治一切鬼惡氣長服止冷

瓜和丸或作湯空腹飲其補虛羸然亦有毒發則熱氣衝上狂躁不能寐至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也時珍言曰婦人無子多由血少不能攝精俗醫謂子宮虛冷投以辛熱或服艾葉不知艾性至熱人大火灸則氣下行入藥服則氣上行本草正言其性溫不言其熱世



人喜溫率多服之久久毒發何嘗歸答於艾哉予考蘇頌圖經而因然有感焉時珍曰艾葉生則微苦太辛熟則微辛太苦主溫熱純陽也可以取太陽真火可以回垂絕元陽服之則走三陰而逐一切寒濕轉蕭殺之氣為和灸之則透諸經而治百種病邪起沈痾之人為康泰其功亦大矣蘇恭言其生寒蘇頌言其有毒一則見其能止諸血一則見其熱氣上衝遂謂其性寒有毒誤矣蓋不知血隨氣而行氣行則血散熱因久服致久上衝之故爾夫藥以治病中病則止若素有虛寒痼冷婦人濕鬱帶漏之人以艾和歸附諸藥治其病夫何不可而乃妄意求嗣服艾不輟助以辛熱藥性久偏致使上躁是誰之咎歟於艾何九艾附丸治心腹諸痛調婦人諸病頗有深功膠艾湯治虛痼及妊娠產後下血尤著奇效老人丹田氣弱膈腹畏冷者以熟艾入布袋兜其臍腹妙不可言寒濕脚氣亦宜以此灰入內附方舊二十四新二十七傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛以乾艾葉三升水一斗煮一升頓服取汗時方艾葉三升妊娠傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血用艾葉如雞子大酒三升煮二升半分為二服傷寒類要中風口喝以葦

五寸一頭刺入耳內四面以麝香封不遠風一頭以艾灸之七壯患右灸左患左灸右此方在勝金方內中風口噤熱艾炙承漿穴六頻車二穴各五壯千金方中風掣痛不仁不隨並以乾艾針許捺團結瓦

著輒目而燒艾熏之一舌縮口噤以生艾搗傳之乾艾浸濕亦可聖濟錄咽喉腫痛醫方大成用嫩艾搗汁細熨之○經驗方用青艾和葦葉時即知矣見肘后方

熟艾於陰囊下殺道正門當鬼擊中惡卒然着人如刀刺狀胸脇腹內病刺切痛不可按或即吐血鼻中出血中間隨年歲灸之斗門方

定効或隔蒜灸之候口中狐惑蟲爛病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢宜急治下部不曉此者但攻其土而下部生蟲食有艾氣立愈簡便方紅爛見五臟便死也燒艾於管中熏下部令烟入或少加雄黃更妙醫中燒烟亦可

頭風久痛新艾揉為丸時時嗅之以黃水出為度青囊雜纂頭風面瘡痒出黃水艾二兩醋一升砂鍋煎取汁每薄紙上貼之一日二三上御藥院方心腹惡氣艾葉搗汁飲之藥性論脾胃冷痛白艾末煎湯

生易蛇蟲心痛如刺口吐清水白熟艾一升水三升煮一升服吐蟲出或取生艾搗汁五更食香脯一片乃飲一升當下蟲出見肘后方口吐清水乾艾煎湯熨之怪證奇方霍亂吐下不止以艾一把水三

臺秘要老白痢艾葉丸用陳北艾四兩乾薑炮三兩為末醋煮倉米糊丸梧子大諸痢艾葉陳皮等分煎湯服之亦可為末酒煮爛飯和丸每鹽湯下二三九聖濟總錄

暴泄不止陳艾一把生薑一塊水煎熱服生編糞後下血艾葉生薑煎濃汁服三合千金方野雞痔瘡先以槐柳湯洗過以艾灸上七壯取效郎中王及乘驛入西川數日病痔大作如胡瓜貫於腸頭其熱如火忽三僕仆無計有主郵



云須灸即處乃用上法灸三壯止覺一道熱氣入腸中  
因大轉瀉血積併出瀉後遂失胡瓜所在矣  
三兩芍藥四兩水五升清酒五升煮取三升乃納  
膠令消盡每服溫酒一升日三服 金匱要略  
婦人胎動 或腰痛或胎心或下血不止或倒產子死腹中  
胎動迫心 作痛艾華雞子  
大以頭醋四升

前二升分溫服 婦人產中 連日不止熱艾雞子大阿膠妙為末半兩乾薑一錢水五盞先煮艾  
子母秘針 葉至二盞半傾出入膠烺化分三服一日服盡 初產世古今錄驗  
產後腹痛 欲死因感寒起者陳斯艾二斤焙乾搗鋪臍上以絹覆住熨之待口中艾氣出  
則寒氣亦從艾氣而出腹中之痛亦自然止其功不可輕視 楊誠經驗方  
食療 產後腹痛 則寒氣亦從艾氣而出腹中之痛亦自然止其功不可輕視 楊誠經驗方

燒灰水服二 鼻血不止 艾灰吹之亦可以艾 盜汗不止 熟艾二錢白茯苓三錢烏梅三個水一  
錢 千金方 葉前服 聖惠方 鍾煎八分臨臥溫服 通妙真人方 火眼腫痛 以艾燒爛用鹽湯洗候煙盡  
應更入黃連 面上好點 艾灰桑灰各三升以水淋汁再淋至三遍以五色布結於中 婦人面瘡 名粉花瘡以定粉五錢菜子油調洗器內  
尤佳斗門方 同煎令可凡時每以少許傅之自爛脫甚妙 外臺秘要 用艾一二團燒煙熏之候煙盡覆地上一

夜取出調搗永無瘡痕亦 身面疔目 艾火灸三壯即 驚風風 艾真者四五兩水四五盞煮六七沸入大口瓶內盛之用麻布  
良生肉 試望試驗方 聖惠方 將手心故瓶上重之如冷再熱如神 陸氏積德堂方 瘡瘡重  
法 熟艾一兩木鑿子三錢雄黃二錢硫黃一錢為末搽入艾中分四 小兒疳瘡 艾葉一兩水一升煮 小兒爛瘡 良子母秘錄 瘡瘡口  
條每以一條安陰陸氏中寶被理烘重後服通聖散 醫方摘要 刺瘡至痛乃點藥三遍其眼目板玉山韓光以此治人神驗貞觀

冷 不合燒艾烟 白爛風瘡 乾艾隨多少以浸麵醪酒如常 疔瘡腫毒 艾蒿一箇燒灰於竹筒中淋取汁以二合和石灰如糊先以針  
重之經驗方 法日飲之覺瘡即瘡 肘后方 艾蒿一箇燒灰於竹筒中淋取汁以二合和石灰如糊先以針  
初瘡州徐使君訪得此方予用治三 發背初起 未成及諸熱腫以濕紙攤上先乾處是頭著艾灸之不論壯數痛者灸至不痛瘡不合  
十餘人得効 孫真人千金良方 不痛者灸至痛乃至其毒即散不散亦免內攻真神方也 李鋒兵部手集 瘡瘡不合

瘡口冷滯以此艾煎湯洗 咽喉骨哽 用生艾蒿數升水酒共一斗煮四 誤吞銅鐵 艾蒿一把水五升煎一升搗 諸瘡瘡 艾火數壯甚  
後白膠重之見直指方 升細細飲之當下 外臺秘要 服便下 錢相公篋中方 諸瘡瘡 艾火數壯甚  
風濕瘡 化蠟少許攤紙上鋪艾以筒卷成筒燒燭隨左右熏鼻及烟令使滿

口呵氣即反止痛新季謹此月餘一試即愈 普濟方



實氣味辛暖無毒主治明目療一切鬼氣

神走田野也壯陽助水臟腰膝及暖子宮  
明發時服三九以飯三五匙壓之日再服消百惡氣其更

人與此甚相宜也

附錄夏寧別錄有名未用曰味甘主百疾清絕氣弘景曰此藥神奇乃爾不復識用可恨也時珍曰父名  
小量此名夏寧父矣有病能回絕氣此主百病清絕氣恐是一物重出也故附於父之後耳

千年艾

綱目集解時珍曰千年艾出武當太和山中小莖高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘其尖極面青白林間黃花如野菊而

葉氣味辛微苦溫無毒治男子虛寒婦人血氣諸病痛水煎服之

時珍

茵陳蒿

本草名藏器曰此雖蒿類冬不死更因舊苗而生故名茵陳後加蒿字耳

集解別錄曰茵陳生太山及邱陵坡岸上五月

上昂牙時珍曰傳云樛櫨雅以及吳華本草並作因塵不知是何義者爾及立秋米陰乾私景曰今處處有之似等

蒿而葉細狀似楊柳冬不死至春又生轉節異曰華似青蒿而背白大明曰茵陳出和州南山嶺上一名石茵陳頌曰近道時有之

不及太山者佳者初生苗高三五寸似蓬蒿而葉細無花實五月七月采莖葉陰乾今謂之山茵陳江蘇府一種茵陳葉大根粗黃白

色至夏有花實陸州一種曰蒿一似青蒿而背白本土皆以為茵陳入藥今南方醫人用山茵陳乃有數種蓋其說云山茵陳汁京及

北地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用者莖葉都似家茵陳而太高三四尺氣極芳香味甘辛俗又名聖

腦薄荷葉中所用乃石香葉也皆空細色黃味辛甚香烈性溫若欲作解脾藥服大令人煩以本草論之但有茵陳蒿無山茵陳注云似

蓬蒿而緊細今汁京北地所用山茵陳是也大體世方用山茵陳療癰疽發汗藥均然少効江南山茵陳療癰疽更勝比見諸醫驗詢謂家

療黃疸利小便與世方都不應今試取汁京所用山茵陳為解肌發汗藥均然少効江南山茵陳療癰疽更勝比見諸醫驗詢謂家

茵陳亦能解肌下膈去胸中煩方家少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵陳蒿當別是一物上瘡自異不得為山茵陳也此說

亦可據但以功較之則江南者為勝以經言之則非本草所出醫方所論更當考論爾歟曰凡使須用莖有八角者陰乾去根細切勿令

犯火時珍曰茵陳昔人多時為蕪敗入藥用山茵陳所以別家茵陳也洪翁俞老國賦云酣糟紫莖之掌沐醴膏陳之綠是也今准揚人

二月二日猶采野茵陳苗和粉麵作茵陳餅食之後人各據方上所傳要致淆亂今山茵陳二月生苗莖葉如艾其葉

如淡色青蒿而背白葉較緊細而扁整九月間細花黃色結實大如艾子花實與艾與菴蘭花實相似亦有無花實者

莖葉氣味辛微寒無毒

曾曰神農岐伯雷公苦無毒黃帝辛無毒權曰苦辛有小毒大明曰

石茵陳苦辛無毒伏硝砂張元素白苦甘性中微湯入足太陽經

主治風濕寒熱邪氣數結黃疸反服



輕身無氣耐老面白悅長年白兔食之仙本  
治通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕  
通關節去滯熱傷寒用之  
器石茵陳治天行時疾

熱狂頭痛頭眩風眼疼瘰癧女人癰疽并閃損之絕  
明發明公景曰仙經曰白蒿白兔食之仙而今前詳方云此恐是誤耳宗奭曰張仲

熱面身汗黃多熱期年不愈醫作食治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病愈去方用山茵陳

山梔子各三分秦艽升麻各四錢為散每用三錢水四合煎二合去滓食後溫服以知為度此藥以山茵陳為本故事之至好古曰張仲

景曰茵陳梔子大黃湯治濕熱也梔子梔皮湯治燥熱也如茵陳湯則濕黃黃則燥黃濕則瀉之燥則潤之可也此  
二藥治陽黃也韓祇和李思訓治諸黃用茵陳附子湯大抵以茵陳為君主而佐之以附子大黃各隨其寒熱也  
附方舊二茵陳黃

熱寒瘧傷寒頭痛風熱瘰癧利小便以茵陳切切煮羹食之生食亦宜  
食醫心鏡遍身風痒生瘡疥用茵陳煮汁洗之立瘥千金方瘰癧風病茵陳蒿而搥水一斗五升者取七升先以皂莢湯

崔行功風疾癰急茵陳蒿一斤林米一石麴三斤和  
好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等分水  
煎要風疾癰急如常法釀酒服之聖濟總錄瘰癧黃如金二錢煎服日服二三十六黃方遍身黃茵陳蒿一把同生薑一塊搗

男子酒疸用茵陳蒿四根梔子七箇大田螺一箇連殼  
取熱赤腫山茵陳車前子等分煎湯細  
持爛以百沸白酒一大盞沖汗飲之秘方也

青蒿本經下品釋名本方濟本經去聲祝書本經去聲  
行義保昇曰草蒿江東人呼為祝蒿為其氣息似祝也北人呼為青蒿爾雅云蒿藋也孫

云蒿草之高者也按爾雅諸蒿獨藋得單稱為蒿別錄曰青蒿生華陰川澤弘景曰處處有之即今青蒿人亦取雜香采食之深是

豈以諸蒿葉皆白而此蒿獨青異於諸蒿故耶集解曰嫩時醋淹為蔬自自然香葉似茵陳蒿而青不白蒿四人許四五月采日乾入藥

詩云食野之蒿即此蒿也頌曰青蒿春生苗葉細可食至夏高四五尺秋後開細深黃花下便結子如粟米大八九月采子陰乾根

葉子葉並入藥用乾炙作飲香尤佳宗奭曰青蒿得春最早人別以為蔬根赤葉香洗括夢溪筆談云有二種一種黃色一種青色本單  
謂之青蒿亦有所別也陝西銀綬之間蒿叢中時有一兩葉圓而青色者土人謂之香蒿葉與常蒿同但常蒿色淡青此蒿深青如松櫨  
之色至深秋餘蒿並黃此蒿獨青其氣芬芳過古人所用以漂青者為勝不然諸蒿何嘗不青時珍曰青蒿一月生苗葉粗如指而肥軟  
莖葉色並深青其葉微似茵陳而面背俱青其根白修治法曰凡使惟中為妙到膝即仰到腰即使使子勿使葉使根勿使莖四件  
硬七八月間開細花頗香結實大如麻子中有細子修治若同使翻然成痼疾采得葉用七歲兒七箇溺浸七日七夜漉出乾乾



葉莖根子氣味苦寒無毒時珍曰主治疥癩瘡毒治骨節間目本鬼毒瘰癧婦人血氣腹內滿及冷

熱久痢秋及用子春夏用苗並搗汁服亦暴乾為末小使入酒和服藏補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令黑不老兼去積殺風毒

心痛熱蕘搗汁服并貼之明治瘧疾寒熱時生搏傳金瘡止血止痛良燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡瘰癧肉贅癰疽子要頭白青

熱勞為最古方單用之時珍曰青蒿得春不少陽之氣最早故所主之證皆少陽厥陰血分之病也按月令通集舊方伏內庚日采青蒿懸於門庭內可辟邪至陰氣為末冬至元旦各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼症伏尸有所伏附方新十三男婦勞

瘦青蒿細剉水三升童子小使五升同煎取一升半去滓入器中煎瘧疾寒熱肢體倦疲不拘男婦八九月青蒿成實時采之去枝梗以成膏丸如梧子大每空心及卧時溫酒吞下二十九斗門方虛勞寒熱童子小便浸三日曬乾為末每服二錢烏梅一箇煎湯服

靈骨蒸鬼氣童子小便五斗澄清青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉相和納大釜中以猛火煎取三大斗去滓漉金令淨再以苑方微火煎可二大斗入猪膽一枚同煎一大斗半去火待冷以簾器盛之每欲服時取甘草二三兩炙熟為末以煎和搗乾

枅為丸空服粥飲下二十九丸漸加至骨蒸煩熱童子小便一太盞煎五分空心溫服十便良方虛勞盜汗煩熱口乾用青蒿一斤取汁三十丸止崔元亮海上神效方

一兩熬至可丸丸如梧子大每食後米飲煎服二十丸名青蒿煎聖方瘧疾寒熱兩桂心一兩為末未發前酒服二錢經驗方用端午日采青蒿葉陰乾桂心等為末

每服一錢先寒用熱酒先熱用冷溫酒發甚但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃升赤白痢下五月五日采青蒿艾等分同豆豉搗

酒發日五更時服之切忌發物溫酒發甚半兩為末每服二錢白湯調下存仁方赤白痢下五月五日采青蒿艾等分同豆豉搗

一盞半煎服聖濟總錄鼻中衄血青蒿持汁服之青蒿葉不用莖用莖不用葉為末金瘡撲損時方用青蒿搗封之血止

等分五月五日搗和腦乾臨時為細末搗之牙齒腫痛青蒿一把煎水毒蜂螫人即安肘后方耳出濃汁青蒿末綿裹納鼻中肉青蒿灰石灰等分淋汁

子氣味甘無毒治明目開胃炒用治勞瘦壯健小便漫用之治惡瘡疥癬風癰煎洗之明治鬼氣為末酒服方寸匕時珍



附方 新清眼 三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾為末每升華水煎服見希  
一 禾熟眼 空心服二錢久服明目可夜看書名青金散 十便良方 節開

黃花蒿 釋名黃蒿 大明曰臭蒿一名草蒿時珍曰香蒿臭蒿通可名草蒿此蒿與青蒿相  
似但此蒿色綠帶淡黃氣辛與不可食人家采以辟瘴黃酒麴者是也

葉氣味苦寒 治小兒風寒驚風時

子氣味苦寒 治無子 治治下氣開胃止盜汗及邪氣鬼毒 明

白蒿 本經上品 釋名繁 種由胡 藥蒿 音商時珍曰白蒿有水陸二種爾雅通謂之繁以其易繁衍也曰繁蒿即今陸生艾蒿也平黃  
蒿曰繁皆艾蒿之通名象秋氣蕭蕭之氣 別錄曰白蒿生中山川澤二月采弘景曰蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不  
各有種名至秋老則呼為蒿矣白賴曰 集解曰白蒿生中山川澤二月采弘景曰蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不  
蒿從初生至秋白於眾蒿為顯曰蓬蒿可以為茹故詩箋云以豆薦繁也陸機詩云凡艾白色為蒿今白蒿先諸草發生香美可食生  
蒸宜宜領曰此草古人以為茹今人但食蓬蒿不復食此或疑白蒿即蓬蒿而正統食療又別著蓬蒿條所說不同明是二物乃知古今  
食品之異也又今階州以白蒿為茵陳其苗葉亦相似以入藥恐不可用也時珍曰白蒿處處有之有水陸二種本草所用蓋取水生  
者故曰生中山川澤不曰山谷平地也二種形狀相似但陸生者葉不及水生者廣美爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹草即陸生者蒿俗呼  
艾蒿是矣庶食九種解毒之草白蒿其一也詩云予以采繁子沼于左傳云賴繁賴繁之菜可以薦於鬼神蓋於王公並指水生白蒿  
而言則本草白蒿之為蓬蒿無疑矣爾雅謂草為蒿非矣鹿乃山獸蒿乃水蒿陸機詩疏謂草為牛尾蒿亦非矣牛尾蒿色青不  
白細葉直上狀如牛尾也蓬蒿生陂澤中二月發蒿葉似嫩艾而破細面青背白其莖或赤或白其根白脆采其根莖生熟  
隨時皆可食蓬蒿也 景差大招云其蔬蒿葉不沾薄請吳人善調酸醢葉蒿為蔬不沾而甘美此正指水生者也

苗根氣味甘平無毒 治心腹邪氣風濕癰腫中氣長毛髮令黑療心懸少食常饑服輕身耳目聰明不老

經生接醋海為殖食甚益人搗汁服去熱黃及心痛曝為末水飲空心服一匙治夏月暴水痢燒成淋汁煎治淋瀝疾 說利腸開胃殺河



本草綱目 卷十五

鱉魚時珍曰服食家七禽散云白鳧食白鳧仙與菖蒲同法耳時珍曰本經附方一惡瘡癰疾但是惡疾通體面目有瘡者皆

者取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍服之梅師方

子氣味王治氣為米酒服之良

角蒿唐本集解目角蒿似白蒿花如瞿麥紅亦可愛子似王不留行黑色作角七月八月采採昇日葉似蛇牀青蒿子角似蔓青也而

邪蒿二味真似角蒿只是此香而角蒿味辛蒿有小毒治乾濕諸瘡有瘡者唐本治口齒瘡絕勝附方新二齒齕宣露角蒿燒灰

乾葉外臺較要方口瘡不瘥人胸中並生者不拘大人小兒以角蒿月蝕耳瘡用蒿灰瘞之

蘼蒿拾遺名義蒿時珍曰陸農師云蘼之為言也高哉亦哉也義科集解時珍曰蘼蒿生高崗似小薊有根先於百草

注云即慈蒿也生澤國漸加虛葉似斜蒿而細科二月生莖葉可食又可蒸香美頗似蘼蒿但味帶麻不似蘼蒿香甘氣味辛溫無毒治破血下氣者食之藏器

馬先蒿本經中品馬新蒿唐本馬矢蒿本經石草別錄爛石草同虎麻時珍曰蒿氣如馬矢故名馬先乃馬矢字訛也馬新又馬先之集解

別錄曰馬先蒿練石草並生南陽川澤菜曰葉大如薊薊花紅白色二月八月未莖葉陰乾用八月九月實熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之葉薊苗短小其子夏中熟一物初生極相似也蒿錫曰按爾雅云薊牡鼓註云即蒿之無子者詩云匪我伊薊陸機云牡

蒿也二月始生七月開花似胡蘇花而紫赤八月生似角小豆角銳而長一名馬新蒿是也頃曰郭璞以牡鼓為無子而陸機云有子二說小異今常用有子者為正時珍曰別錄牡蒿馬先蒿原是二條陸機所謂有子者乃馬先蒿而復引無子之牡蒿釋之誤矣牡蒿詳見

條氣味無毒別錄曰練石草寒主治寒熱瘧疾中風濕痺女子帶下病無子練石草治五癰破石淋膀胱中結氣利小便便別錄惡瘡







華生節節生花實似雞冠子黑色莖作四方枝五月采又云九月采實醫方稀有用實者崇禎白芨射初春生時亦可浸洗淘去苦水若作藥食浸及不凋悴也時珍曰凡附近水濕處其繁春初生苗如嫩蒿入夏長三四尺莖方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一梗三葉葉有尖岐寸許一節節生穗叢繞抱莖四五月間穗內開小花紅紫色亦有微白色每莖內有細子四粒粒大如同蒿子有三稜褐色藥肆往往以作巨勝子貨之其草生時有臭氣夏至後即枯其根白色細頭圓經謂其葉似荏其子黑色似雞冠子九月采實寇宗奭衍義謂其莖實不凋者皆誤傳也此草有白花紫花二種莖葉子穗皆一樣也但白者能入氣分紅者能入血分別而用之可也按閩閩事宜云白花者為益母紫花者為野天麻返魂丹註云紫花者為益母白花者不是陳藏器本草云芨射生田野間人呼為臭麻天麻生平澤似馬鞭草節節生紫花中有子如青箱子孫思邈千金方云天麻草莖如火麻冬生苗夏着赤花如鼠尾花此皆似以芨射天麻為二物蓋不知其是一物二種凡物花皆有赤白如牡丹芍藥菊花之類是矣又按郭璞爾雅注云推音推即芨射又名益母葉似荏白華華生節間又云廣音推方莖葉長而銳有稜穗間有花縹色可以為飲江東呼為牛鞭據此則是推積名本相同但以花色分別之其為一物無疑矣宋人重修本草以大蔞草誤註天麻尤為謬矣陳藏器本草又有紫葉云生江南陰地似益母方莖對節白花主產後血病此即芨射之白花者故其功主血病亦相同

子修治時珍曰凡用微炒香亦宜在熟烈日曝燥春煎去核取仁用氣味辛甘微溫無毒別錄曰甘微寒時珍曰甘平溫反制硫黃主治明目益精除水氣久服輕身本經瘵血逆大熱頭

痛心煩別錄產後血脹天春仁生食補中益氣通血脉填精髓止渴潤肺吳治風解熱順氣活血養肝益心安竟調女人經脉崩中帶下產

後胎前諸久服令人有子時珍曰芨射之治血行氣有補陰之功故名益母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無滯產後無虛以珍發明其行中有補也時珍曰芨射子味甘微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入氣分紫花者入

血分治婦人經脉不調胎產一切血氣諸病妙品也而醫方鮮知用時珍常以之同四物香附諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言腫子散大者禁用芨射子為其辛溫主散能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視芨射行血甚捷腫子散大血不足也故禁之非助火也血滯病目則宜之故曰明目

莖大明曰芨射莖器曰莖時珍曰莖葉味辛微苦花味微苦主治癰瘡作浴湯本搗汁服主浮腫下水消惡毒腫乳癰丹毒



畫併傳之又服汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁入耳中主聾耳攣攣蛇寇毒蘇入面藥令人光澤治粉刺或活血破血調經解毒治

胎漏產難胎衣不下血運血風痛崩中漏下尿血瀉血痢瘡痔疾打撲內損瘀血大便小便不通時珍曰益母草之根莖花葉實

陰血分風熱明目益精細女人經脈則單用芫蔚子為良若治腫毒瘡瘍消水行舊十四濟陰返童丹江高師備禮求於名醫所

血婦人胎產諸病則宜並用為良蓋其根莖花葉專於行而子則行中有補故也附方新七

得者其效神妙活人甚多能治婦人胎前產後諸疾危證用野天麻一名益母又名火欬又名負擔即芫蔚子也葉似艾葉莖類大麻方

梗四面四五六月節節開花紅紫色如藥花南北諸處皆有白花者不是於端午小暑或六月六日花正開時連根收采陰乾用葉及花

子用足鐵器以石器碾為細末煉蜜丸如彈子隨證服用湯使其滾燒存性為末酒服功與黑神散不相上下其藥不限丸數病愈為

度或丸如梧子大每服五七十丸又可搗汁澆淨熬膏服之胎前臍腹痛或作聲者米飲下胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不

止當歸湯下產後以童子小便化下一丸能安魄定魄血氣自然調順諸病不生又能破血痛養林息調經絡並溫酒下胎衣不下

及橫生不順死胎不下經日脹滿心悶心痛並用炒鹽湯下產後血暈眼黑血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事以童子小便和

酒化下產後結成血塊臍腹疼痛時發寒熱有冷汗或面垢顛赤五心煩飲並用童子小便酒下或薄荷自然汁下產後惡露不盡

結滯刺痛上衝心胸滿悶童子小便酒下產後瀉血水以棗湯下產後痢疾米湯下產後血崩漏下糯米湯下產後赤白帶下

前臍臍湯下月水不調溫酒下產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒下產後氣喘欬嗽胸膈不利惡心吐酸水面目

浮腫兩脇疼痛舉動失力溫酒下產後月內欬嗽自汗發熱久則變為骨蒸童便酒下產後鼻衄舌黑口乾童便酒下產後兩太

本草綱目

卷十五

草部

益母草搗熟以暖水少許和絞取汁頓服之韋宙獨行方產後血運心氣欲絕益母草研汁產後血閉不下者益母草汁一小匙帶赤白益母草花開時米搗為

亦可如速行即更煉之可丸收之服至七日則痰漸平復也產婦惡露婦人難產益母草搗汁七大合煎減半頓服立止無新

不盡及血運一二服產其藥無忌又能治風益心力外臺秘要方婦人難產以乾者一大握水七合煎服韋宙獨行方月死腹中

草連根草莖花洗淨於籠上攤黑布乾乾刀切長五寸勿用鐵刀置於大鍋中以水浸過二三寸煮者極草爛水減三之二濾去草

取汁約五六斗入盆中澄半日以綿濾去濁滓以清汁入釜中慢火煎取一斗如稀錫飯甑封收每取梨大暖酒和服日再服或和羹粥

化下產後大小便不通煩躁口苦者薄荷湯下婦人久無子息用溫酒下每書近效方治產婦諸疾及折傷內損有瘀血每天蔞

陽六痛呵欠心忪氣短羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛並米飲每書則痛神方也三月采益母草一名負擔一名夏枯

草連根草莖花洗淨於籠上攤黑布乾乾刀切長五寸勿用鐵刀置於大鍋中以水浸過二三寸煮者極草爛水減三之二濾去草

取汁約五六斗入盆中澄半日以綿濾去濁滓以清汁入釜中慢火煎取一斗如稀錫飯甑封收每取梨大暖酒和服日再服或和羹粥

亦可如速行即更煉之可丸收之服至七日則痰漸平復也產婦惡露婦人難產益母草搗汁七大合煎減半頓服立止無新

不盡及血運一二服產其藥無忌又能治風益心力外臺秘要方婦人難產以乾者一大握水七合煎服韋宙獨行方月死腹中

結滯刺痛上衝心胸滿悶童子小便酒下產後瀉血水以棗湯下產後痢疾米湯下產後血崩漏下糯米湯下產後赤白帶下



下集 小便尿血 益母草汁服一升立瘥 此蘇澄方也 外臺秘要 赤白雜痢 困重者益母草日乾陳鹽梅燒存性等分為末每服三錢白小兒瘡痢 垂死者益

同米煮粥食之取足以瘥為度甚佳 取汁飲亦可也 見廣利神效方 痔瘡下血 益母草葉搗汁飲之 食醫心鏡 一切癰瘡 婦人妬乳乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥癩陰蝕並用

千金 益母草 聖惠方用益母草搗打之仍絞五合服即消 醫方大成用益母草四月連花葉之燒存性先以小尖刀十字割開行根

一日夜搗藥三五度重者二日根爛出轉者一日出有瘡根根起即是 瘡毒已破 益母草搗碎甚 益母草為末水調塗乳上一宿

根出以針挑之出後仍傳學生肌易愈風寒房室酒肉一切毒物 喉閉腫痛 益母草搗爛新汲水一盞絞濃汁噴入耳中 聖惠方 粉刺黑斑 閩闔事宜云五月五日收帶根天麻紫花者晒乾燒

過收之半年方用入面藥甚能潤肌蘇頌曰唐天后鍊益母草澤蘭法五月五日采根苗具者勿火著土暴乾搗羅以麴水和成團如雞

子大再暴乾仍作一爐四旁開竅上下置火安藥中央大火一炊久即去大火留小火養之勿令火絕經一伏時出之襲器中研治鋪

再研三日收用如澡豆法日用一 馬咬成瘡 若低草切細和醋炒汁 辛生小兒 益母草五兩煎水浴之

方每十兩加滑石一兩胭脂一錢 孫真人方 不生瘡疥 簡要濟眾 益母草 拾遺集 益母草 益母草生江南陰地似益母方莖對節自花時珍曰此即益母之白花者乃爾雅所謂雅是也其紫花者爾雅所謂

盤采 益母草 益母草生江南陰地似益母方莖對節自花時珍曰此即益母之白花者乃爾雅所謂雅是也其紫花者爾雅所謂

苗氣味辛無毒治破血產後腹痛煮汁服藏 微街 薇音眉 薇名薇街 唐本無心 吳普曰南人謂之吳風草一名薇街草言薇有疾街此草

按鄭道元水經注云魏興錫山多生薇街草有風不侵無風獨搖則 集解 別錄曰薇街生漢中川澤及宛甸岢鄆七月采葉陰乾葉



種楚人謂大者為大吳風草小者為小吳風草條  
昇曰景似花耐叢生有毛其花黃色其根亦黑色

**莖葉氣味苦辛寒無毒**別錄曰微寒之**主治風濕痺節痛驚癇吐苦性氣賊風鼠癰腫**本經**暴瘰逐水瘡瘻瘻久服輕身明目**別錄婦人服之絕產

**人服之絕產**藏器**煎水洗漂疽疔惡瘡**時珍出外月時珍曰廉街乃桑間所用治風病自汗藥而後世不知用之誠缺畧也桑間科精義**附方**新**二年深惡瘡**無心草根約若根狼毒白丁香各五錢麝香錢為末搽之○又小兒破傷風病

之以澤瀉木各三五分麻黃五分合**附方**新**二年深惡瘡**無心草根約若根狼毒白丁香各五錢麝香錢為末搽之○又小兒破傷風病

以三指撮為後飯後飯者先服藥也**附方**新**二年深惡瘡**無心草根約若根狼毒白丁香各五錢麝香錢為末搽之○又小兒破傷風病

口禁沒心草半兩白附子炮二錢半為末**附錄無心草**宋圖經續曰生秦州及商州鳳翔各縣皆出之三月開花五月結實六七月采根苗末每服一錢薄荷酒灌下 聖濟錄

**夏枯草**本經**下品****釋名**冬白**乃東**別錄**鐵色草**震亨曰此草夏至後即枯蓋紫絨陽之氣得陰氣則枯故有是名**集解**別錄曰夏枯草生蜀郡川谷四月采然曰處

月開花作穗紫白色似丹麥花結子亦作穗五月便枯四月采之時珍曰原野間甚多苗高一二尺許其莖微方葉對節生似旋復葉而長大有細齒皆白多故莖端作穗長一二寸穗中間淡紫小花一穗有細子四粒丹溪云無子亦欠察矣嫩苗淹浸去苦味油鹽拌

之可**正誤**宗奭曰今謂真鬱自秋使生經冬不悴春開白花夏結子震亨曰真鬱草有臭味即食**正誤**宗奭曰今謂真鬱自秋使生經冬不悴春開白花夏結子震亨曰真鬱草有臭味即食

**莖葉氣味苦辛寒無毒**之才曰土瓜為之使伏宋砂**主治寒熱瘧氣癰疽頭瘡破癰散癰結氣**本經**腫濕痺身**震亨曰本草言夏枯草大

陰血脉之功而不言及觀其退寒熱虛者可使若實者以行散之藥佐之外以火葉灸亦漸取效時珍曰黎居士易簡方夏枯草治目疾用沙糖水浸一夜用取其能解內熱緩肝火樓全善云夏枯草治目珠疾至夜甚者神效或用苦寒藥點之反甚者亦神效蓋目珠連日

本即係也屬厥陰之經夜甚及點苦寒藥反甚者夜與寒亦陰故也夏枯草純陽之氣補厥陰血脉故治此如神以陽治陰也一男子至夜目珠疾連肩稜骨及頭半邊腫痛用黃連膏點之反甚諸藥不效欠厥陰少陽痰隨止半日又作月餘以夏枯草二兩香附二兩甘草



四錢為末每服一錢半清茶調服  
下咽則疼減半至四五服良愈矣  
**附方** 新六明目補肝 肝虛目睛痛冷淚不止血脈痛羞明怕日夏枯草半兩  
赤白帶下 夏枯草花開時

服二錢米飲下食  
前徐氏家傳方 **崩不止** 夏枯草為末每服方寸  
七米飲調下 聖惠方 **產後血暈** 心氣絕者夏枯草搗絞汁  
服一錢大妙 徐氏家傳方 **撲傷金瘡** 夏枯草口嚼爛罯  
上即愈衛生易簡 **汗斑白點** 夏枯

濃汁日洗之  
乾坤生意 **瘰癧刀** 不問已潰未潰或日久成漏用夏枯草六兩水二鍾煎七分食遠溫服虛甚者則煎汁熬膏服并塗患處兼以  
薛已外科經驗方

劉寄奴草

唐本 釋名寄奴大烏藤菜 綱目時珍曰按李延壽南史云宋高祖劉裕小字寄奴微時伐荻新州遇一大蛟射之明日  
合藥傳之裕曰神何不殺之曰寄奴王者不可殺也裕吹之童子皆散乃收藥而反每遇金瘡傳之即愈人皆以此故故集解恭曰劉寄奴  
因稱此草為劉寄奴草鄭樵通志云江南人因漢時謂劉為卯金刀乃呼劉為金或又謂金寄奴江東人又謂烏藤菜 集解恭曰劉寄奴  
似艾蒿長三四尺葉似山蘭草而尖長一莖直上有穗葉互生其子似稗而細標并曰今出越州嵩之類也嵩四五尺葉似菊其花白色  
其實黃白色作穗夏月收苗乾之謂曰今河中府孟州漢中涪州亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高二三尺以來葉青似柳四月開  
碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細根淡紫色似蒿莖六月七月采苗及花子通用時珍曰劉寄奴一莖直上葉似蒼木尖長糙  
澀而深背淡九月莖端分間數枝一枝攢簇十朵小花白瓣黃蕊如小菊花狀花罷有白絮如苦買花之絮其子細長亦如苦買子所云  
實如黍稷者似與此  
不同其葉亦非蒿類

子 苗修治 數日采得去莖葉只用實以布拭去薄殼令淨拌  
同修治 酒蒸從已至中泉乾用時珍曰莖葉花子皆可用 氣味 苦溫無毒主 治破血下脹多服令人下痢 蘇下血止痛治產後餘

瘡 瘡血極效 別心腹痛下氣水脹氣通婦人經脈攢結止霍亂水瀉明小兒尿血新者研末服時附方 舊一 大小便血 劉寄奴為末  
集簡方 折傷瘀血 在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一兩水二升煎 氣脹滿 劉寄奴穗實為末每服三錢酒煎服不可遇 霍亂

二錢即止  
集簡方 折傷瘀血 七合入酒及童子小便各一合頓溫服之 千金方 血氣脹滿 劉寄奴穗實為末每服三錢酒煎服不可遇 霍亂

痢 劉寄奴草煎汁 湯火傷火灼劉寄奴搗末先以糯米漿粥掃上後乃搽末並不痛亦無痕大驗 腫痛劉寄奴為末搽  
聖濟總錄 湯火傷火灼之方凡湯火傷先以鹽末搽之護肉不壞後乃搽之藥妙 本事方 風入瘡口 之即止 聖惠方 小兒夜

痢 劉寄奴草煎汁 湯火傷火灼劉寄奴搗末先以糯米漿粥掃上後乃搽末並不痛亦無痕大驗 腫痛劉寄奴為末搽  
聖濟總錄 湯火傷火灼之方凡湯火傷先以鹽末搽之護肉不壞後乃搽之藥妙 本事方 風入瘡口 之即止 聖惠方 小兒夜

痢 劉寄奴草煎汁 湯火傷火灼劉寄奴搗末先以糯米漿粥掃上後乃搽末並不痛亦無痕大驗 腫痛劉寄奴為末搽  
聖濟總錄 湯火傷火灼之方凡湯火傷先以鹽末搽之護肉不壞後乃搽之藥妙 本事方 風入瘡口 之即止 聖惠方 小兒夜

痢 劉寄奴草煎汁 湯火傷火灼劉寄奴搗末先以糯米漿粥掃上後乃搽末並不痛亦無痕大驗 腫痛劉寄奴為末搽  
聖濟總錄 湯火傷火灼之方凡湯火傷先以鹽末搽之護肉不壞後乃搽之藥妙 本事方 風入瘡口 之即止 聖惠方 小兒夜

痢 劉寄奴草煎汁 湯火傷火灼劉寄奴搗末先以糯米漿粥掃上後乃搽末並不痛亦無痕大驗 腫痛劉寄奴為末搽  
聖濟總錄 湯火傷火灼之方凡湯火傷先以鹽末搽之護肉不壞後乃搽之藥妙 本事方 風入瘡口 之即止 聖惠方 小兒夜



帝聖許數年而地龍  
一寸水煎謹心許

赤白痢

水煎服之加梅白加薑艾元氣如宜方

宗圖

六月凌霜

卷之四

經虫 有冬霜蟬立之名

卷之四

劉寄奴而青軟七八月着花似薄荷結子無用

莊子

莖葉氣味甘無毒治發背癰疽腫板毒同甘草作末米汁調服

經名仙文書經定參

華河北近山都郡以郡並名叢蘭又上黨紫團山亦有名定矣章又名仙女蒿今所在有之甚多

癯黃人莫能知時珍曰此草有殊功而不著其形狀今蜚傳亦名麗吞草九仙子亦名仙女嬌與此同名非一物也當詳博訪

花及根氣味

主之應黃黑瘦頭明黃進身壯熱小便黃赤眼如金黃色面又青黑心煩氣痛遠近心如刺頭旋欲割兼腸下有瘕

氣及黃連經用有驗其藥春三月采花陰乾一升搗散每平明空腹服三方寸匕和生麻油一盞日一服至五月止以爲度其根亦黃連搗汁一盞空腹服須臾卽利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑亦瘳忌酒麵猪肉蒜粉酪等

旋覆花

[illegible]

策也。禹錡雜錄云：金花一名銀葵，別錄曰：花樹生平澤川，名五月采花，日乾二十日成。葉厚，出通江。杜牧詩：金葵不敗落。沙白梁武帝時，遣人中國，得此種，出河南。北國亦有，形似荳蔻，惟合從葉用之，餘無所用。非此故覆花根也。保昇曰：葉似水蘇，蘇

如菊六月至九月采種。今所在皆有。二月以後生苗多近水旁。大似紅藍而無少異。一尺以外葉似柳葉。二月間花如銅錢。大罌黃色。上黨田畝人呼爲金錢花。七八月采花。今近道人家園圃所種金錢花。花葉同極易繁。微恐即旋覆也。李昉曰：旋覆黃

金錢菊水澤邊生者花小瓣黃家裁者花大莖發黑瘠癯使然其根細白俗傳露水滴下即生故易繁亦不然



主治結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補

經消胸上痰結噎如膠漆。心痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉。早多賤利大腸通血脈。益益澤別。赤腫逐大腹開胃止。

下食服棗仁水去頭目風字消堅軟痞治噎氣好冬月張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噎氣不除有七物旋復代赭湯治婦人有三部施澶陽湯治居士治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花凡用之

無已曰觀則氣堅痰湧之鹹以軟痿堅也寒當以冠帶要言其行須水去頭目風亦走散之藥病人涉虛者不宜多服冷利大腸時珍曰投覆乃手大陰神十陽明大腸藥也頭治諸病其功只在行水下氣通血脉爾李衛公言喫其花能損目唐慎微本草誤

根方收附  
改正之  
附方  
新三  
中風  
旋覆花洗淨焙研煉蜜炙梧子大夜臥  
以香湯下五丸至七丸十九  
經驗方  
產下  
虛寒搏其肚腹花柳覆花湯用旋覆花二兩  
莖十四莖新絳少許水三升者一升頓服金

蝨耳瘡 旋覆花燒研貼之  
 和塗之 集簡方  
 小兒眉癰 小兒眉毛眼睫因癰退不生用野油化即旋覆花黃煎  
 即天麻黃防風等分為末洗淨以油調塗之  
 總微論

得金瘡止血明治疔瘡腫毒珍

治風濕  
錄別

本草綱目卷之六

本草綱目珍曰青相子名義未詳胡麻葉亦青最此草又多名  
子胡麻地中與之同名豈以其似而然耶青蒙亦名草蒿其

相似而名亦相同何哉其子明目與決明子同功故有草決明之名且其子至曰書箱主平谷道旁三月采其葉陰乾五月六月采其花葉似雞冠苗似苋故謂之雞冠葉鄭樵通志云俗名牛尾蒿者誤也公孫龍曰處處有之似麥糲花其子甚細別有草蒿或作蒿葉

主療珠珀類形名又相傳可疑而實兩種也琴曰此草苗高二餘葉細軟花紫白色實作瓜子形而扁光似芫實而大生下濕地四月五月剋夏人名為芫實草頭曰琴江澤州郡近道亦有之二月生青苗長三四尺葉潤似柳而較莖如蒿青紅色六月七月內生花上紅下

白子薑花而扁以葉葉似薑而直下猶莖生根六月八月采子時珍曰青蒠生山野間嫩苗以莧可食長則高三四尺苗葉皆實與雞冠花一樣無別但雞冠花細或有大而扁或圓者此則結間出花穗大長四五寸狀如兔尾花紅色亦有黃白色者在穗中與



雞冠子及莧子一樣雞冠蘇恭言其結角設葉蕭炳言莧花者名附錄桃朱術曰青箱一種花莧者名陶朱術莧相似藏器曰桃朱術陶朱術與陳藏器所說不同又有天靈草亦此類也並附於下附錄桃朱術曰青箱一種花莧者名陶朱術莧相似藏器曰桃朱術

月五日乃收子帶之鴈來工時珍曰莧葉種子並與雞冠同其葉九月鮮紅望之如天靈草時珍曰按土宿真君本草云狀如雞冠花葉今婦人為夫所愛鴈來花故名吳人呼為老少年一種六月葉紅者名十樣錦亦如之折之有液如乳生江湖荆南陂池間

五月取汁可制雄硫者雖煉砂用之思學子只是味不同思學子味苦煎之有涎

莧葉修治時珍曰凡用先燒乾杵白乃搗用之氣味苦微寒主治邪氣皮膚中熱風癢身癢疥癩惡瘰癧痔瘡下部腫癰別傳江服大療

濕癩蘇恭止金瘡血明

子氣味苦微寒主治唇口青治臟邪氣益腦髓鎮肝明目耳聾筋骨風寒濕痺治肝臟熱毒衝眼赤障青翳腫

惡瘰癧權發明相宜時珍曰青箱子治眼與決明子竟實同功本經雖不言治眼而言一名草決明至唇口青則其明目之功可知矣

目者肝之竅唇口青者是厥陰經之證古方除熱亦多用之青箱子之為厥陰藥又可知矣況用之附方一鼻不止治胃欲死青箱子治目往往有驗尤可徵據親畧云初平中有青牛先生常服青箱子丸年百餘歲如五六十者耳

貞元廣利方

雞冠宋嘉祐時珍曰以雞冠處處有之三月生苗入夏高者五六尺莖者纒數寸其葉青葉頗似白莧菜而窄頗有赤脉者纖如雞雞之冠花大有圍一二尺者唐層卷出可愛子在穗中黑細光滑與莧一樣實其穗如紅紫狀花最耐久霜後始焦

苗氣味甘涼無毒治瘡痔及血病時珍



子氣味苦涼無毒治止腸風瀉血赤白痢藏器崩中帶下藥炒用大

花氣味苦治痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶下分赤白崩時珍新附方十吐血不止白雞冠花醋浸煮七次為末結陰便血雞冠花根白皮等

分為末煉蜜為丸梧子大每服三十丸黃芪湯下日二服聖濟總錄糞後下血白雞冠花并子炒服服聖惠方五痔紅腫久不愈或成癆瘡用雞冠花鳳眼草各一兩水二盞煎湯頻洗衛生寶鑑下血脫肛白雞冠花

糊丸梧子太空心米飲每服七十九一方白雞冠花炒搜聖惠方糞後下血白雞冠花并子炒服服聖惠方五痔紅腫久不愈或成癆瘡用雞冠花鳳眼草各一兩水二盞煎湯頻洗衛生寶鑑下血脫肛白雞冠花

婦人白帶白雞冠花乾為末每旦空心酒服三錢赤帶用紅者孫氏集效方白帶沙淋白雞冠花苦壹蘆等分燒存性空心火酒服之摘玄赤白下痢雞冠花煎酒服亦用紅白用白集簡方

紅藍花宋開寶釋名紅花黃藍頌曰其花紅色葉藍頌曰今處處有之人家場圃所種久月布子於熟地至春生苗夏乃有花花下作林叢

多刺花出林上圃人采露采之采已復出至晝而罷林下結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅又作胭脂時珍白紅花一月八月十二月皆可以下種雨後布子如種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小創葉至五月開花如大創花而紅色侵晨采花搗熟以水淘布袋絞去黃汁又搗以酸漿米泔清又淘又絞去汁以膏高覆一宿晒乾或捏成薄餅陰乾收之入藥搗碎用其子五月收采淘淨搗碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可為車脂及燭者

花氣味辛溫無毒元素曰人心養血謂其苦溫陰中之陽故入心佐當歸生新血好古曰辛而甘苦溫肝經血分藥也入酒良主治產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮

服亦主蠱毒開寶多用破留少用養血震亨活血潤燥止痛散腫時珍白血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與之同類故

筆云新昌徐氏婦病產運已死但胸膈微熱有名醫陸氏曰血閉也得紅花數十斤乃可活遂而購得以大鍋煮湯減三附方新五六於密格之下昇婦寢其上重之湯冷再加有頃指動半日乃蘇按此亦得唐許胤宗以黃芪湯事柳太后風病之法者也

十二種風伏神景治六十二種風兼服內血氣痛用紅花一大兩分為一切腫疾紅花熟搗取汁服不過三服便瘳外臺秘要喉痺塞取汁一小升服之以



瘦力度如冬月無生花以藥者  
濕絞汁煎服極靈驗 廣利方  
便尤妙 紅藍花三錢半粘蠟五錢為末以綿杖絞淨  
子母時時吹之無花則用枝葉一方去麝 聖惠方  
胎衣不下 方同上 楊氏產乳  
產後血運 心氣絕紅花一兩為末分作二服酒二  
盞前一盞連服如口噤不開灌之或入小

起簡 便方  
子至天行瘡瘰癧數顆開功與花同 蘇方  
血氣刺痛 紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升拌子暴乾重搗  
節案九梧子大空心酒下四十丸 張仲景良方  
瘡癰出 紅花

草茸各半兩蟬脫二錢半水酒鍾半煎  
減半量大小加減服 麗安湯傷寒論  
草中風 水一升煎取七合去渣細細嚥之 貞元廣利方

苗聖淫種毒腫 關  
番紅花 綱釋名洎夫藍 綱撒節集解  
時珍曰番紅花出西番回回地面及天方國即彼地紅藍花也元時以入食饌用氣末  
目釋名洎夫藍 綱撒節集解 按張華博物志言張騫得紅藍花種於西域則此即一種或云城地氣稍有異耳

草無毒治憂鬱積氣悶不散活火服令人心喜又治驚悸 附方  
新傷寒發狂 驚悸恍惚用撒法即二分水一盞浸  
一宿服之天方國人所傳玉蘭醫林

燕脂 綱釋名燕脂時珍曰按伏候中華古今注云燕脂起自紂以紅藍花汁凝作之調脂飭女面產於燕地故名燕脂  
目釋名燕脂 綱脂或作輕故匈奴人名妻為閼氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作燕脂脂者並謬也  
燕脂時珍曰燕脂有  
藍花汁染胡粉而成乃蘇鶚演義所謂燕脂葉似蓴花似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉  
而成乃段公路比戶錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月間花似蓴土人采之者為燕脂粉亦可導帛如紅藍者也一種以山燕  
花汁成作者鄭皮胡本古中載之一種以紫紺染線而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫紺味草無毒涼兒  
多用紫紺燕脂俗呼紫紺是也大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉助面亦謂之胡燕脂見集部

要集  
草部

本草綱目 卷十五 草部

燕脂 綱釋名燕脂時珍曰按伏候中華古今注云燕脂起自紂以紅藍花汁凝作之調脂飭女面產於燕地故名燕脂  
目釋名燕脂 綱脂或作輕故匈奴人名妻為閼氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作燕脂脂者並謬也  
燕脂時珍曰燕脂有  
藍花汁染胡粉而成乃蘇鶚演義所謂燕脂葉似蓴花似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉  
而成乃段公路比戶錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月間花似蓴土人采之者為燕脂粉亦可導帛如紅藍者也一種以山燕  
花汁成作者鄭皮胡本古中載之一種以紫紺染線而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫紺味草無毒涼兒  
多用紫紺燕脂俗呼紫紺是也大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉助面亦謂之胡燕脂見集部

燕脂 綱釋名燕脂時珍曰按伏候中華古今注云燕脂起自紂以紅藍花汁凝作之調脂飭女面產於燕地故名燕脂  
目釋名燕脂 綱脂或作輕故匈奴人名妻為閼氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作燕脂脂者並謬也  
燕脂時珍曰燕脂有  
藍花汁染胡粉而成乃蘇鶚演義所謂燕脂葉似蓴花似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉  
而成乃段公路比戶錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月間花似蓴土人采之者為燕脂粉亦可導帛如紅藍者也一種以山燕  
花汁成作者鄭皮胡本古中載之一種以紫紺染線而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫紺味草無毒涼兒  
多用紫紺燕脂俗呼紫紺是也大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉助面亦謂之胡燕脂見集部

燕脂 綱釋名燕脂時珍曰按伏候中華古今注云燕脂起自紂以紅藍花汁凝作之調脂飭女面產於燕地故名燕脂  
目釋名燕脂 綱脂或作輕故匈奴人名妻為閼氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作燕脂脂者並謬也  
燕脂時珍曰燕脂有  
藍花汁染胡粉而成乃蘇鶚演義所謂燕脂葉似蓴花似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉  
而成乃段公路比戶錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月間花似蓴土人采之者為燕脂粉亦可導帛如紅藍者也一種以山燕  
花汁成作者鄭皮胡本古中載之一種以紫紺染線而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫紺味草無毒涼兒  
多用紫紺燕脂俗呼紫紺是也大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉助面亦謂之胡燕脂見集部

燕脂 綱釋名燕脂時珍曰按伏候中華古今注云燕脂起自紂以紅藍花汁凝作之調脂飭女面產於燕地故名燕脂  
目釋名燕脂 綱脂或作輕故匈奴人名妻為閼氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作燕脂脂者並謬也  
燕脂時珍曰燕脂有  
藍花汁染胡粉而成乃蘇鶚演義所謂燕脂葉似蓴花似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉  
而成乃段公路比戶錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月間花似蓴土人采之者為燕脂粉亦可導帛如紅藍者也一種以山燕  
花汁成作者鄭皮胡本古中載之一種以紫紺染線而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫紺味草無毒涼兒  
多用紫紺燕脂俗呼紫紺是也大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉助面亦謂之胡燕脂見集部



聾耳浸汁滴

解毒

附方新乳頭裂破

之危氏得效方

嬰孩口

白厚如紙用坏子燕脂以乳汁調塗之

集簡方漏瘡腫痛猪膽七

脂十箇洗水和勻搽

防瘰入目

之集簡方

瘰癧倒

乾脂三錢胡桃燒存性一箇研末用

救急方

大薊小薊

別錄

大薊小薊

山牛蒡

千針草

經野紅花

綱目大薊是虎刺小薊是貓刺

珍曰刺猶鸞也其花如髮也曰虎曰貓因其狀犖犖也曰鳥者大也牛蒡因其根似夢根也雞項因其並似雞之項也集簡方大薊千針草其花狀也即推通志謂爾雅之藥曰狗毒者即此未知是否藏器曰薊門以多刺得名當以北方者為勝也二角小薊五月采葉曰大小薊葉雖相似功力有殊大薊生山谷根癰腫小薊生平澤不能消腫而俱能破血目小薊處處有之俗名青刺薊二月生苗二三十時併根作菜茹食甚美四月高天餘多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草四月采苗九月采根並陰乾用大薊苗根與此相似但肥大薊常與白大小薊皆相似花如髮但大薊高三四尺葉微小薊高一尺許葉不微以此為異作菜雖有微芒不害人

大薊根

氣味

溫無毒

治女子赤白沃

胎止吐血鼻衄

令人肥健別錄根絞汁服半升中血下立瘥

糖葉治腸腹腫痛

作運機損生研酒并小便任服

又瘰癧瘰癧同題研罾之

明

小薊根

氣味

溫無毒

治瘰癧瘰癧

破宿血生新血

下血血崩瘡出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合瘡

及蜘蛛蠅毒服之亦佳

治熱毒風并胸膈煩悶

開胃下食退熱補虛損

苗去煩熱生研汁服

作茶食除風熱夏月熱煩不止

搗汁半升服立瘥

小薊力微不可退熱不似大薊能健養下

氣也

小薊皆能破血但大薊兼瘰癧而

九釐出血

方同上

小薊專主血

熱吐血

口乾用刺薊葉及根絞取

石磬血

不止刺薊根汁和酒服乾

者為末冷水服

普濟方

萃瀉鮮血小薊



汁溫服一升  
梅師方 疳中下血 大小前根一升酒一斗漬五宿任飲亦可酒煎服或生搗汁溫服○又方小前根葉五兩  
煎至一盞分二服一 聖濟總錄 金瘡出血不止小前苗搗爛塗之 孟詵療食本草 小便熱淋馬前根汁  
日服盡 聖濟總錄 金瘡出血不止小前苗搗爛塗之 孟詵療食本草 小便熱淋馬前根汁

者刺刺草新水調傅瘡上 癰瘡作痒 刺刺葉搗汁服 婦人陰痒 小前者湯日洗者 諸瘡不合 虎前根搗  
乾即易之 簡要清眾方 癰瘡作痒 刺刺葉搗汁服 婦人陰痒 小前者湯日洗者 諸瘡不合 虎前根搗  
中 肘 丁瘡惡腫 千針車四兩乳香一兩明礬五錢為 后方 末酒服二錢出汗為度 晉濟良方

續斷 本經 屬科 本經 龍豆 南草 時珍曰續斷屬折接 骨皆以功命名也 續斷 日采弘景曰按桐君錄云續斷生蔓延葉細如  
白有汁七月八月采根今皆用莖葉節節細皮黃皺狀如雞脚者又呼為桑上寄生時人又有接骨樹高大餘許葉似胡黃皮主金瘡  
廣州又有續斷藤一名諸勝斷其莖以器承取汁飲療虛損絕傷用木頭長髮折枝插地即生恐皆非真李當之云是虎前與此大率但  
虎前亦療血瘰曰所在山谷皆有今俗用者葉似芋而莖方根如大前黃白色陶說非也續曰今陝西河中興元舒越晉絳諸州亦有之  
三月以後生苗幹四稜似芋藤葉兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大前赤黃色謹按范汪方云續斷即是馬前與小前  
葉相似但大於小前兩葉似菱葉而小厚兩邊有刺刺入其花紫色與今越州所圖者相類而市之貨者亦有數種少能辨其粗良醫  
草茅根綠真相似若誤服令人筋軟時珍曰續斷之說不一桐君言是蔓生葉似接骨李當人但以節節斷皮黃皺者為真數日又使忽用  
之范汪言是虎前日華子言是大前一名山牛草蘇恭錄續斷言葉似芋藤根似大前而名醫別錄復出大小前除雜難依據但自漢以  
來皆以大前為續斷相承久矣究其實則二蘇所云似與桐君相符當以為正今人所用以州中來色赤而瘦折之有烟塵起者為良  
鄭樵通志謂范汪所說者乃南續  
斷不知何據蓋以別川續斷耳

根修治 徵曰凡采得根橫切剉之又去向裏 氣味 苦微溫無毒 別錄曰辛普曰神農雷公黃帝李當之皆無 主治 傷寒補不足金瘡癰  
硬筋以酒浸一伏時焙乾入藥用 氣味 苦微溫無毒 別錄曰辛普曰神農雷公黃帝李當之皆無 主治 傷寒補不足金瘡癰

瘍折跌續筋骨婦人乳難久服益氣力 本經 婦人崩中漏血金瘡肉漏止痛生肌肉及疏傷惡腹痛關節緩急 別錄 諸毒通當血脈

本草綱目 卷十五 草部

十三



時珍曰宋張叔潛秘書知劍州時其閣下病血痢一醫用平胃散一兩人川續斷末二錢半每打一舊二、三、五、七、九、十一、十三、十五、十七、十九、二十一、二十三、二十五、二十七、二十九、三十一、三十三、三十五、三十七、三十九、四十一、四十三、四十五、四十七、四十九、五十一、五十三、五十五、五十七、五十九、六十一、六十三、六十五、六十七、六十九、七十一、七十三、七十五、七十七、七十九、八十一、八十三、八十五、八十七、八十九、九十一、九十三、九十五、九十七、九十九、一百。

一針水煎服即愈  
經云子會  
時行利疾  
叔潛之子以方傳人往往有驗小兒痢服之效

除新二便淋瀝二條斷于終月日

馬薊根也初瘰氏

古人至辰台方冲三月酉宜服此川續斷酒浸杜仲薑汁炒去絲各用  
絲驗女女月重二兩為末粟肉煮開午知如吾子大要服一  
葉發者矣血運心悶煩熱厭厭氣欲絕心頭硬乍寒乍熱續斷

所之此藥救產垂危丁毒方內骨要利中骨草葉並關

死  
子母秘錄  
才才才才  
卷之立效  
衛生易簡方

夫音模別業音模名曰夫音模爾音模告反音模時珍曰凡物裨曰夫此音模聲弘景曰苦美處處有之倉人反音模生食之音模桑昇曰并王下音模臣曰

下品 采之 稚木 物嫩時可食故以名之 得角 無刺可生噉子若貓 刺當五月五日采苗暴乾 曰今人以爲居靈作也

珍曰爾雅鈴芙即此苦芙也芙大如指拈中空莖頭有臺似薊初生可食許慎說文言江南人食之下氣令折東人清明節采其嫩苗食

云一節不生於此竟投汁和米煮食其色清久留不敗造化指南云苦菜大者名苦籍葉如地黃味苦初生有白毛入夏抽莖有毛開

君如朋也處虎巖地有之入爐大家所用

五  
東  
改  
至  
三  
品  
月  
且  
平  
冬  
意  
五  
示  
二  
別  
年  
夏  
二  
三  
山  
谷  
一  
三  
人  
二  
二

由丹砂老後冥無盡生治面目通身赤瘡燒灰傳之亦可生食錄火燒灰瘳金瘡拉驗景丹毒月前湯洗尋其效下氣氣熱時

本經  
澤蘭  
葉上緣有深白華時珍曰屋之西北黑處謂之漏凡物黑色謂之盧此草秋後即黑故名  
徐曰漏室主香山

異於衆草故有漏盧之稱唐韻作蔞其莢如蒜故俗呼爲鬼油麻云

草巨在山廬是黃帝所鑒成乃在上郡及出近道市人取苗用之俗中取根名鹿驢根苦酒摩以療瘡齊恭曰此藥俗名芡蒿莖葉似

本經言有毒非烏喙也今人以馬前以爲天者烏喙並示非也  
子夏之夢古仙經之夢大如卵語有四五種七八月後皆黑異於衆草蒿之類也常用其莖葉及子未見用根其衆驢山南謂之

勝於根江寧及上党者佳陶云鹿驪蘇云木藜蓋亦非也扁鵲自藏器曰月用方止二月疑多付三

蠶山人以洗瘡疥保昇曰臺似角蒿今曹究州下濕處最多六月七月采空日乾置於灰簞大月日乾者並月同多者凡夫以之

上有白花生頭曰今汴東州郡及羣海州皆有之舊說莖葉似白蒿花黃白莢莢若飭大房類油蒜而小今諸郡所圖上惟單州者差



相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹漢州者花紫碧如單葉蓮花葉下及根旁有白茸蘆之根如蔓青而細又類蘆本黑色淮南人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鉅齒狀一物而殊類如此醫家何所適從當依舊說似單州出者為勝又本草飛廉名漏蘆云與苦芩相類其根生則肉白皮黑乾則黑如玄參七八月采花陰乾用所說與秦州海州所圖漏蘆花葉及根頗相近然彼人但名漏蘆不曰飛廉也戰曰一種真似漏蘆只是味苦酸誤服令人吐不止時珍曰接沈存中筆談云今方家所用漏蘆乃真飛廉也飛廉一名漏蘆苗似苦芩根如牛蒡綿頭者是也采時用根今閩中所謂漏蘆莖如油蘆高六七尺秋深枯黑如漆采時用苗乃真漏蘆者也餘見飛廉下

**根苗修治**

凡采得漏蘆細切以生甘草相對拌蒸之從已至申揀出晒乾用

**氣味鹹寒無毒**

別錄曰大寒藏器曰有毒葉曰無毒足陽明本經藥也之才曰連翹為之使

**主治皮膚熱毒瘡癰瘰癧**

**瘰癧乳汁久服輕身益氣耳目聰明不老延年**

本經

**止遺溺熱氣瘡瘁如麻豆可作浴湯**

別錄

**通小腸泄精尿血腸風赤眼小兒壯熱攪損**

**續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿補血長肉通經**

大發明

公景曰此藥久服甚益人而服食方罕見用之近道出者惟瘰癧耳耳市人皆取苗用時珍曰漏蘆下乳汁消熱毒排膿止血生肌殺蟲故東垣以為手足陽明藥而古方治癰疽發背以漏蘆湯為首稱也龐安常傷寒論治癰疽及預解時行瘧

**瘡熱用漏蘆葉云無則以山梔子代之亦取其寒能解熱蓋不知其能入陽明之故也**

附方

**新六腹中虬蟲**漏蘆為末以餅腫和方服之外臺秘要

**小兒無辜**

病肚脹或時世痢冷熱不調以漏蘆一兩杵為散每服一錢以豬肝一兩人鹽少許日者熱空心頓食之

聖惠方

**冷勞泄瀉**漏蘆一兩艾葉炒四兩為末米醋三升入藥末一半同煮成膏入後未和丸梧子大每溫水下三十丸

聖濟

**總錄**

**瘰癧後帶上**

方同

**乳汁不下**乃氣脉壅塞也又治經絡凝滯乳內脹痛邪畜成癰服之自然內消漏蘆二兩半蛇退十條炙焦為末

和劑方

**瘰癧風**筋脉拘牽古聖散用漏蘆炒半兩地龍去土炒半兩為末生薑二兩取汁入一切瘰癧

**痛蜜三兩同煎三五沸入好酒五合盛之每以二盃調水一錢溫服**

聖濟總錄

**一切瘰癧**發於月初發二日但有熱證便宜服漏蘆湯退毒下膿乃是宣熱拔毒之劑熱退即住服漏

**瘰癧用有白茸者連根生黃芪沉香各一兩生粉草半兩大黃白**

白頭瘰癧

**瘰癧**五月收漏蘆是燒灰猪炒一兩為細末每服二錢用薑葉湯調飲下李氏瘰癧集驗方

**飛廉**

本經

**名漏蘆**

水禾

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

飛廉

**本草綱目**

**卷十五**

**草部**

**十四**



集解別錄曰飛廉生河內川澤正月采根七月八月采花陰乾公景曰處處有之極似苦艾惟葉多刻缺葉下附莖韌有皮起似前羽其

陶氏所說者一種生山岡上者葉頗相似而無刻缺且多毛其莖亦無羽其根直下更無旁枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄

參用莖葉及根療瘡蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬前似苦艾者為漏蘆並非是也保昇曰葉似苦艾莖似軟羽花紫色子毛白所

在平澤皆有五月六月采日乾數日凡使勿用赤脂並與飛廉形狀相似似亦脂蔓見酒則色便如血以此可表識之頃曰今秦州所園

漏蘆花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹海州所園漏蘆花紫碧色如單葉蓮花葉下及根旁有白茸裏之根黑色如蔓莖而細又類

蔥本與陶前所說飛廉相近然彼但謂之漏蘆今醫家罕有用飛廉者不能的識時珍曰飛廉亦蒿類也蘇頌園經疑海州所園之漏蘆

是飛廉沈存中筆談亦言飛廉根如牛蒡而綿頭古方漏蘆散下云用有白茸者則是有白茸者乃飛廉無疑矣今考二物氣味功用俱

不相遠似可通用蓋或一類有數種而古今名稱各處不同乎

# 根及花

修治法凡用根先刮去粗皮將細以氣味苦平無毒權曰苦鹹有毒之才主治骨節熱重酸疼久服令人身輕本頭

眩暈重皮間邪風如蜂螫刺魚子細起紅瘡癰瘻痔濕痺止風邪欬嗽下乳汁入服蒸明目不老可煮可乾用別錄主治留血瘡

蝕殺蟲蘇小兒疳積為散外服火熨治頭風旋暈時珍曰易洪泡外子書言飛廉單服可輕身延年人言服飛廉者過涉

# 方

一瘡口及下部用飛廉膏燒灰搗篩以兩錢匕著痛處其痛則忍之若不痛則非

# 苧麻

別錄名時珍曰苧麻作經可以積紵故謂之紵凡麻絲之細者為縵粗者為紵縵集解曰苧麻舊不著所出州土今閩蜀江

人葉如楮葉而無入面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月采按陸機草木疏云苧一種數十莖宿根在土

中至春自生不須栽種荆揚閩三州諸園種之歲再刈便剝取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者者之用縴布今江浙閩中尚復如

此宗與苧如苧麻花如白楊面長成種每一朵凡數十穗青白色時珍曰苧家苧也又有山苧野苧也有紫

苧葉面紫白苧葉面青其背皆白可刮洗者食救荒味甘美其子茶褐色九月收之二月可種宿根亦自生



**根氣味甘寒無毒**補腎十天明**主治安胎貼熱丹毒**治心膈熱漏胎下血產前後心煩天行熱痰大渴大狂服金石藥人心熱

**毒箭蛇咬**明**雁亭汁止消渴**別發明**聖藥**大能補陰而行滯血方藥或惡其賤似未曾用也藏器曰亭性破血將亭麻與產婦

**驚不生**附方**痰咳**聖藥**存性**為末生豆屑三錢食即效未**小便不通**聖藥**方用**蘇根粉半兩為末每服二錢空心新

**連陰除煩**小便血淋**治諸淋**聖藥**五種淋疾**蘇根兩莖打碎以水一盞半煎**斗門方****妊娠胎動**忽下黃汁如膠或如小豆汁腹痛不可忍

**煮四升**每服以水一升入酒半升煎一**月****月腫痛**生亭麻根搗爛坐之**脫肛不收**亭麻根搗爛煎湯**瘰癧發背**初起未成者亭麻根熟搗傅上

**升分作二服**一方不用銀梅師方**外臺秘要****雞骨硬**成用野亭麻根搗汁凡如龍眼大魚骨湯下雞骨難湯下

**葉氣味****聖藥****治金瘡傷折血出瘀血**時珍曰亭麻葉甚散血五月五日收取和石灰搗作團曬乾收貯遇有金瘡折損者研末

**葉搗爛**傳金瘡上如瘀血腹內順流水絞汁服即通**附方****三馬然水瀉**日夜不止欲死不拘男婦用五月五日采蘇葉陰乾為末每服

**血皆化水**以生豬血試之可驗也秋冬用乾葉亦可**附方****三馬然水瀉**日夜不止欲死不拘男婦用五月五日采蘇葉陰乾為末每服

**建復****冷痢白凍**方同**蛇咬傷**青蘇嫩頭搗汁和酒等分服三盞以通傳之毒從數中出以渣棄水中即

**命方****冷痢白凍**上**蛇咬傷**不發者傷處有竅其雄蛇無竅是雄蛇以針挑破傷處成竅傅藥摘玄方

**尚麻**唐本草**釋名****白麻**時珍曰尚一作須又作蘇**集解**蘇曰尚即須麻也今人取皮作布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似亭而薄花黃

**實氣味****辛無毒****治赤白冷熱痢炒研為末每客湯服一錢****癰腫無頭者吞一枚**蘇生眼翳肉起倒睫毫髮時



根生治痢方用之

新一切眼疾

萬麻子一升為木以豬肝批片蘸末炙熟再蘸再炙

聖濟總錄

早

醫藥久不愈者用替實以

尾節取黃肉去其殼每十兩下得四兩非此法不能去殼也用豬肝薄切滾藥慢炙熟為末醋和丸梧子大每服三十丸白湯下一方以替實內袋中蒸熟暴為末蜜丸溫水下

聖濟總錄

大青

別名時珍曰其葉紫中品藥名時珍曰其葉紫

集解別傳曰大青三四月采並陰乾弘景曰今出東境及邊道紫莖長大許莖葉皆用頌曰今江東州郡采莖葉陰乾用時珍曰處處有之高二三丈莖圓葉長三四寸面青背淡對節而生八月開小花紅色成簇結青實大椒顆九月色赤

並莖葉

味甘微鹹不苦

主治時氣頭痛大熱口瘡

除時行熱毒甚良

景治溫疫寒熱

權治熱毒風心煩渴疾口

乾小兒身熱痰風癰及金石藥毒毒腫毒大熱毒痢毒瘡瘡丹毒

時珍曰

頌曰古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭

珍曰大青氣寒味微苦鹹能解心胃熱毒不特治傷寒也朱肱活人書治傷寒發赤斑煩痛有犀角大青湯大青四物湯故李象先指掌賦云陽毒則狂斑煩亂以大青升麻可回困篤

口瘡大青十八針黃連十二針水三升煮一升服一日凡二服以瘥為度千金方

熱病下痢

國篤者大青湯用大青四兩甘草赤石脂三兩

肘后方

熱病發狂赤色煩痛大

青葉搗汁灌之取小兒

衛生易簡方

大青一兩阿膠甘草各二錢半鼓二合分三服用水一盞半煎一盞入膠烱化服○又犀角大青湯用大青七錢半犀角二錢半梔子十枚鼓二撮分二服每服水一盞半煎八分溫服南陽活人書

惡之候也大青為末納口中以酒送下保幼大全方

小

青

宋圖經曰小青生福州三月生

葉氣味

主治傳腫瘡癰瘡

治血痢腹痛研汁服解毒

時珍附方

新蛇虺傷

衛生易簡方

用小青一握細研入香白芷

半兩酒調服手按患處候黃水出為效



摘玄方用小青大青牛膝并同搗汁和酒服以渣傳之

### 中晝發露

小青草并水浸去泥控乾入沙糖搗汁急灌之

## 胡盧巴

宋嘉祐

種名苦豆

為錫曰胡盧巴出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋采入人多用嶺南者或云是番羅蘭子未

者真好今醫家治元氣虛冷為要藥如多時珍曰凡入華海淨以酒浸氣味苦大溫無毒

冷腹脹滿面色青黑得棗子桃仁治勝脫氣甚效治冷氣疝瘕寒濕脚氣益若野暖丹田

和丸梧子大每服五七十丸空心鹽酒下其散以熱米飲下與太子相間空心服日各一二服時珍曰胡盧巴右腎命門藥也元陽不足

巴八錢苗香六錢已戟云心川烏頭炮去皮各二錢揀實去核四錢炙黃五錢並炒為末酒糊丸梧子大每服十五丸小兒五丸鹽酒

下太醫薛已云一人病寒症陰囊腫痛服五苓諸藥不效與此而平也又張子和儒門事親云有人病目不視思食苦豆即胡盧巴頻頓

不缺一周歲而目中微痛恍如蟲行人皆漸明而愈按此附方新小腸氣痛胡盧巴炒研末每服一錢附子硫黃各七錢五分

亦因其益命門之功所謂益火之原以消陰翳者是也

為末酒煮麵糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯或鹽酒下服至兩月大後出自腹則除根方廣心法附餘陰腫痛或小便

湯三四十丸方見聖濟總錄

腸疝氣下元虛冷久不愈者沉香內消丸主之沉香木香各半兩胡盧巴氣攻頭痛胡盧巴炒三錢酒浸焙各半兩乾姜炮二錢

酒浸炒小茴香炒各二兩為末酒糊丸梧子大每服五七十丸鹽酒下

氣 腿膝疼痛行步無力胡盧巴酒浸一宿焙破故紙炒香各四兩為末以木瓜切頂去瓢安

## 參實

本經

中品名

馬蘭子

馬鞭子

馬鞭子

馬鞭子

馬鞭子

馬鞭子

馬鞭子

馬鞭子

馬鞭子

馬鞭子

馬鞭子

馬鞭子

## 本草綱目

卷十五

草部

十一



寶修

時珍曰凡入藥炒過用  
治病則以醋拌炒之

氣味甘平無毒

保昇曰雲頭山人服

上合安壽長記書中執氣風寒發重安力子之者人及匹

身本  
經止心

煩滿利大小便長肌膚肥大

療金瘡血內虎雖神有效蘇婦人血氣弱月經不調平無水不古同中苦二首一刀卷第二

鼻血及吐血

通小腸消酒毒治毒病殺蠱毒毒蛇咬  
大治小腹痛銀丹分漬水煎者時付  
一者一症病醫治不治者馬國子凡

下日三服  
千金方

寒濕不能食及腹內一切諸疾消食肥肌馬蘭子一升  
 侯軍重衛衛士易簡方用蘇實一合升麻五分水一升煎三  
 升洗淨空腹服一合酒

升麻一  
錢半

此方為密方水服一錢又方烏蘭子八兩水煎服之

**水利白濁** 張文仲備多方用烏蘭子以六月六日超教各等分爲不空心米飲服六寸

此方為密方水服一錢又方烏蘭子八兩水煎服之

**水利白濁** 張文仲備多方用烏蘭子以六月六日超教各等分爲不空心米飲服六寸

分為散熱丹

湯服二方寸七八服即斷也冷下血有虎瘡瘻破者不治馬蘭子一斤研破浸夏三冬七日酒洗可食為半斤黃連

方

黃各四兩為末以浸藥酒打糊丸梧子大每服三十丸溫酒下日三服見效 普濟

花實及根

葉去白

經療喉痺多服令人瘡

別主體

時又明日

草花實皆入藥列仙傳云寇先生采人



云北方田野人患胸腹飽脹者取馬棘花搗涼水服即泄數行而愈  
按此則多服令人泄之說有驗而蓋貴為之馬蘭更無可以疑矣  
附方新六睡死不寤嘉增根一握搗爛以水絞噤口瘡馬蘭花二

一兩為末溫酒服三合蜜一合慢火熬成膏飲之日五七度一單方汁飲之口瘡者灌下無生者以煎煎汁  
沙石熱淋馬蘭花

故羊頭二七枚燒粟米一合炒為末小便不通馬蘭花炒茴香炒華蔓炒為一切癰疽發背惡瘡用鐵掃帚同松毛  
每服二錢酒下目二服名通神散木每酒服二錢十便良方一切癰疽牛膝以水煎服乾坤生意面上癰癤取鐵掃帚

華芥子煎湯頻洗敷面蛇鼻馬蘭子花杆傳錄必以勒拾遺藏器曰辛溫無毒主冷氣胸閉  
次自消毒域神方

惡實別錄中品釋名鼠粘子別錄大力子綱目勞翁菜綱目便牽牛綱目蠅刺時珍曰其實狀惡而多刺鉤故名其根葉皆可食人呼為牛菜

實殺多刺鼠過之則綴惹不可脫集解別錄曰惡實生魯山平澤恭曰魯山在鄆州東北此草葉大如芋子殼似粟狀實細長如芡蔚子  
故謂之鼠粘子亦如羊負求之比集解別錄曰惡實即牛夢子也處處有之葉大如芋葉而長實似葡萄核而褐色外殼似栗採而小如指

頭多刺根有極大者作菜茹益人秋後菜子入藥時珍曰牛夢子古人種子以肥壤栽之剪苗均淘為蔬取根者賺為肺云甚益人今人  
亦罕食之三月生苗起莖高者三四尺四月開花成叢淡紫色結實如楓林而小夢子細刺百十攢簇之一株有子數十顆其根大者如  
臂長者近尺其色灰黯

七月采子十月采根  
子修治數日凡用揀淨以酒拌蒸待有白霜重日以石拭去粘葉待粉月氣味辛平無毒藏器曰苦元素曰辛溫陽中之主治明目補中除風傷風毒腫諸癰藏研

末浸酒每日服三三蓋降諸風去丹石毒利腰脚又食煎熟按三枚石之散諸結節筋骨煩熱毒吞一枚出癰疽頭蘇恭炒研前飲通利

小便孟詵潤肺散氣利咽膈去皮膚風通十二經元消斑疹毒時珍曰鼠粘子其用有四治風濕癰瘡咽喉風舊五風水身腫

欲製鼠粘子二兩炒研為末每風熱浮腫唯開泰牛夢子一合半生半熟痰厥頭痛牛夢子炒放腹花等分為末頭痛連睛鼠粘子

溫水服二錢日三服聖惠方風熱浮腫為末熟酒服一寸七經驗方痰厥頭痛茶清服一錢日二服聖惠方頭痛連睛石膏等



分為末茶清調因隔不利疏風理涎唾牛蒡子微炒荆芥穗一兩炙甘草半兩懸壺癰喉痛風熱上搏也惡膏炒甘草生等分喉痺腫痛牛蒡子六分馬蘭子六分為散每空心溫水服方寸匕日再服

仍以牛蒡子三兩鹽二兩研勻炒熱色焦喉外廣濟方咽喉癰疹牛蒡子二錢桔梗一錢半粉甘牛蒡子炒汗滓等分以薄

虞氏古風齒牙痛鼠粘子炒煎水含今錄驗風齒牙痛鼠粘子炒煎水含時出不快壯熱狂躁咽隔連塞大便秘澀小兒咽喉腫不利若大便利者勿服牛蒡子炒

和劉舉人吹乳鼠粘一錢麝香少許更癰腫痛鼠粘子二錢炒研末入蜜一匙朴它烏蟬蟬大力子者汁服小蠱腹大

米飲下九風節腫痛風熱攻手指赤腫麻才甚則攻肩背內膝遇暑熱則大便秘牛蒡張文仲方歷節腫痛風熱攻手指赤腫麻才甚則攻肩背內膝遇暑熱則大便秘牛蒡

根莖氣味苦寒無毒權曰甘平藏器曰根須蒸主傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老別根莖牙痛齒痛夢瘧

諸風脚緩弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺癰症瘕冷氣積血蘇根浸酒服去風及惡瘡和葉搗碎傅杖瘡金瘡水不臭風藏主面目煩悶四肢

不健通十二經脉洗五臟惡氣可常作菜食令人身輕輒切根拌豆麪作飯食消腫脹癰疽葉煮汁作浴湯去皮間習習如蟲行又入鹽

花生搗搗一切毒腫發明時通風以竹刀或刺刀刮去土生布拭搗絞取汁一大升和好蜜四大合溫分兩服得汗出使瘧此方得

之在鄧鄭中丞鄧國食熱肉一頓使中暴風附方舊五新時氣餘熱不退煩燥發渴四肢無力不能飲食用天行時疾生牛蒡根搗汁五

外甥盧氏為類陽令有此方服當時便瘧附方一十六時氣餘熱不退煩燥發渴四肢無力不能飲食用天行時疾生牛蒡根搗汁五

服訖取桑葉一把炙黃以水一升煮取五服訖心負恍惚以牛蒡根搗汁一升食傷寒搗搗汗後覆蓋不密致胸背手足攣攣者牛蒡根

錢劉於盆內研細好酒一升同研以新布絞取汁以炭火半秤燒一地坑令赤穉淨傾藥一切風疾十年二十年者牛蒡根一升生地黃



力

斗

天

三

不錢

擣

11

[illegible]

成弘

時川

嫩耳





**實治**大明曰入藥炒熟搗去刺用或酒拌蒸過用**氣味甘溫不毒**別錄曰苦穢曰甘無主毒**治風頭寒痛風濕痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛久**

**服氣**藏器治肝熱明目**治一切風氣填髓暖腰脚治瘰癧瘡疥及瘡癰明少香浸酒服去風補益**時珍曰舊三久瘡不瘥亦可焙研

**末酒糊丸梧子大每酒服三十丸日二服生者搗汁服亦可**朱氏集驗方**大腹水腫小便不利**蒼耳子灰苦蘆末等分每服二錢水下日二服千金良方

**牙齒痛腫**蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之冷即吐去吐後復含**鼻淵流涕**蒼耳子即鑽綠草子炒研為末每白湯點服一二錢證治要訣

**米半升作粥日食****嗜酒不已**范中蒼耳子七枚燒灰投酒中飲之即不嗜陳藏器本草**眼目昏**葉耳實一升為末白

**並葉**修治**白凡采得去心取黃精以竹刀細切****氣味苦辛微寒有小毒**恭曰忌猪肉馬肉米泔伏卵砂**治風濕**別錄中風傷寒頭痛

**頭風濕痺**在骨髓腰膝風毒夏月采曝為末水服一二七冬月酒服或為丸每服三十丸日三服滿百病出如瘡疥成汁出或斑駁

**駁甲錯皮起皮落則肌如凝脂令人省睡除諸毒殺蟲瘡濕濕久服益耳目聰明輕身強志**蘇恭按葉安舌下出涎去目黃好睡燒灰和

**臘猪脂封腫出根煮酒服至狂大吐毒**藏器曰時珍曰蒼耳藥去風熱有效最忌猪肉及風邪犯之則適身發出赤丹也按蘇沈良方云葉耳根苗葉實皆洗淨陰乾燒灰湯淋取濃汁連連兩籠煉之灰汁乾即旋取

**傍金中熱灰湯益之一日夜不絕火乃旋得霜乾蘆根收之每日早晚酒服二錢補煖去風駐顏尤治皮膚風令人膚革清淨每淋沐入**

**少許尤佳宜州學昌從諫服此十餘年至七八十紅潤輕健皆此藥力**斗門方云婦人血風攻腦頭眩悶絕忽死倒地不知人事者用喝

**起草嫩心陰乾為末以酒服一大錢其功**附方舊十二**萬應膏**治一切癰疽發背無頭是瘡腫毒疔瘡一切風痺腫痛牙疼喉痺五

**其效此物善通頂門連腦蓋即蒼耳也**附方新十六**萬應膏**月五日采蒼耳根葉數握洗淨晒姜細切以大鍋五口入水煮爛以篩濾

**去粗津布頭再濾復入淨鍋武火煎滾文火熬稠攪成膏以新罐貯封每以數貼即愈****一切風毒**并殺三蛇腸痔能連食若病胃脹滿心



刈取葉耳葉法暴搗下篩每服方寸又酒或漿水下日二夜三若覺吐逆則以客丸服準計方寸七散也風一切風氣蒼耳嫩葉一石切和麥藥五升作塊

輕者日二服若身體作粟或麻豆出此為風毒出也可以針刺瀉去黃汁乃止七月七九月九亦可採用

於蒿艾中營二十日成獨取米一斗炊作飯者冷暖入麴三升醱之封二十七日成熱後每諸風頭運蒼耳葉晒乾為末每服一錢酒調下

日空心暖服神驗封此酒可兩重布不得令客寒則溢出忌食肉豬肉五說食療方草

二十丸十日全好血風腦運方見發毒致手足腫痛欲斷蒼耳搗汁漬之并以津傳辛中水毒初覺頭目微痛起處骨節痛急日醒

矣楊氏經驗方毒致手足之立效者用心冬用子千金翼辛中水毒手足逆冷三日則蟲蝕下部六七日膿潰

食至五臟殺人也揚崇恩草絞汁服一毒蛇瘡沙虱射工等所傷口嘔眼黑手足攣直毒攻腹內成塊遠近不救疫病不浴五月五日

二升并以綿導導其下部肘后方毒蛇瘡蒼耳嫩葉一握取汁和酒溫灌之以津厚備傷處勝金神方疫病不浴午時多采

蒼耳嫩葉陰乾收之臨時為末冷水服二風癰瘡身痒不止用蒼耳莖葉子等分為末面上粟粒蒼耳葉焙為末食後飲調

錢或水煎舉家皆服能解邪惡千金方風癰瘡每服二錢豆淋酒調下聖惠方面上粟粒一錢一月愈摘玄方赤白汗

玉蒼耳嫩葉天和青鹽搗爛五六大風癰瘡袖珍方用嫩蒼耳荷葉等分為末每服二錢溫酒下日二服乾坤生意意用蒼耳葉為末以

致月間搗之五七次效摘玄方大風癰瘡大楓子油和凡梧子大每服三四十九以茶湯下日二服又方五月五日或六月六日五

更帶露蒼耳草搗取汁飲子服半斤鯉魚一尾剖開不去肚腸入藥卒得惡瘡蒼耳桃皮作反花惡瘡有肉如飯粒破之血出隨生

一錢線縫以酒二盞慢火煮熟令喫不過三五箇魚即愈也忌鹽一百日卒得惡瘡屬納瘡中反花惡瘡反出用蒼耳葉搗汁服三合

并塗之日二上一切腫痛危困者用蒼耳根葉搗和小兒尿絞汁冷服一升日三服拔根甚驗養生方用蒼耳根黃燒灰和醋浸

聖濟總錄一切腫痛乾再上十次即拔根出即真人方蒼耳根三兩半烏梅肉五箇連鬚煮三根滴二鍾煎一鍾熱服取

汗齒風動痛蒼耳一握以漿水煮之喉風病蒼耳根一把老薑一塊研赤目生痛作痛道人頭木二兩乳香一錢每鼻不止蒼耳葉

一小盞服五痔下血五月五日采蒼耳莖葉為末赤白下痢蒼耳草不拘多少洗淨用水煮爛去滓入蜜用產後諸痢蒼耳葉搗汁溫

聖惠方五痔下血水服方寸匕甚效千金翼赤白下痢武火熬成膏每服一二匙白湯下醫方摘玄產後諸痢服半中薑日三四

服聖惠方蒼耳葉蒼耳頭一把以水一升浸水花蜘蛛毒咬人與毒蛇無異用野繅絲即道人頭

患方言蒼耳葉中十餘度飲水愈肘后方花蜘蛛毒搗汁一盞服仍以渣傳之摘玄方

花主治白癩頑癬時



本草綱目  
卷十五

天名精

本經校正 時珍曰據蘇沈二說併入唐本草  
上品本正 氣開實地松別錄有名未用聖松

釋名天夢書

別  
天  
戶  
精  
錄  
上

公唐堃公別  
亦本堃公與

地同玉門精錄

[illegible]

餘  
錄  
蝦

蟻經本可成筆

不首

卷之五 盧別活鹿

草

胡火面草

目  
母  
系  
林  
目

名鶴虱根名

杜牛膠一名天

名精即通廣

為地松葉

與蔓菁菰菜相類故有此名其味甘辛故有蔓菁稱狀如藍而蔓菁好居其下故名蔓菁蔓菁氣似蘭故又有名蔓菁為蘭珍珍曰天名精乃蔓菁之說也其氣如芥菜故有家芥通類之名晉人謂之舌芥華俗人因其氣臊訛為狐狸臊者是也爾雅云芣苢豨食也郭璞注

云江東呼爲狢首可以燔蠶飼食臧器曰郭璞注面狢遠來云即麥口薑者非也陶公注釣狢條云有一草似狼牙氣辛與名爲地松人

種之折傷愈多人因以名之既有活處之名  
正史公景曰天名精即今之麝香亦名麝香夏月杵汁服之除熱病味至苦而云甘或非

於藏器本草解紛亦言天名精為地菰開寶本草不當重出地菰條例宜刊削時珍曰按沈括筆談云世人說不識天名精又要認地

此松亦係誤出。書傳別錄曰：天名精生平原川澤。五月采，係昇曰地松也。小品方名大蔓菁，又名天撫，精葉似山南菘菜。夏秋抽得

並正之合而為一（今角頗似荷花紫白色味辛而香忌口）地菰所在皆有生人家及路旁陰處蔓二三寸葉似松葉而小又曰顧

異所說又曰鶴氣江沅衡湘皆有之春生苗葉嫩似紫蘇大而失長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃  
黑多南人呼其葉爲火交安火交即庵菴雖花實相類而別是一物不可雜因時珍曰天名精微苗綠色似嫩薑芥微有鴝氣洵淨

之亦可食長則起莖開小黃花如小野菊花結實如同蒿子亦相似最粘人衣狐氣尤甚炒熟則香故諸家皆云辛而香亦巴人食買藥

知用之惟戎波斯始知入藥且土產所宜故爾亦藉云出西域而不知中國所飼馬者即是物也詳見蹄養下

葉味甘寒無毒補肺平肝無毒主治瘀血血癥欲死下血止血利小便久服輕身而老除小蠱毒

除胸中結熱止煩渴逐水大吐下  
別破血生肌止鼻衄殺三蟲除諸毒腫下瘡癰痔金瘡內射身癰癰不立者指之已亡  
唐本地松主金

葉

根氣味甘寒

無名別錄曰飛  
盡生汁吐

人

珍曰：德華甘有  
取地黃為之使。

主治

血癥欲死下血

止血利小便

久服堅身而

經除小蟲去瘡



瘡止血解蟲惡毒

瘡止血解蟲惡毒以傅之

瘡止血解蟲惡毒以傅之

瘡止血解蟲惡毒以傅之

只是吐痰止血殺蟲解毒以搗汁服之能止癰疽之止牙疳之傳蛇咬亦治諸瘡也按孫天仁集效方云凡男婦乳蛾喉痛

及小兒急慢驚風牙關緊急不省人事者以鶴虱草一名鐵面草一名母諸茶一名杜牛膝取根洗淨搗爛入好酒絞汁灌之良久即甦

仍以渣漬項下或醋調搽亦妙宋端希集驗方云余被瘡在准西幕府時牙疳大下一刀鐮人以草藥一捲湯洗少時以手蘸湯搗瘡處

即定因求其方用之治人多效乃歟而地慈草也俗人誤為地慈草石中黃誤為地慈草其子名鶴虱正此物也錢李誠方用鶴虱一枚

羅置箇中葛臘方以鶴虱煎水醋漱口或月湯方二

風濕氣前水禽滋仍研草塞瘡處皆有效也附方男女吐血以羊兒泡湯調服日二次衛生易簡因喉重瘡寒盛要治痰涎

下者地於一名鶴虱草連根葉搗汁驚風搗入去痰最妙聖濟總錄用杜牛膝破連草同搗汁灌之不得下置喉風重蚰蟻草即敷而

者還鼻得吐為妙又方主牛膝草及用葉秋末用根一把青蟹半兩同研熟地令吐膿血痰沫立時即愈為風月草細研以生蜜

和丸彈子大每噙一二丸即愈乾者為木鶴虱也地於馬鞭草各一握去根白梅肉一箇白芨一錢風濕瘡赤腫地於搗爛乾即易

客丸亦可名救生丸經效濟世丸方鶴虱也地於馬鞭草各一握去根白梅肉一箇白芨一錢風濕瘡赤腫地於搗爛乾即易

疔瘡腫痛風氣草連根葉搗爛同搗傳發初起地於汁一升日再服瘡重者地於搗汁日服三次外臺秘要惡蛇咬傷地於搗傳之

疔瘡腫痛風氣草連根葉搗爛同搗傳發初起地於汁一升日再服瘡重者地於搗汁日服三次外臺秘要惡蛇咬傷地於搗傳之

鶴虱草氣味苦辛有小毒明見主治蛇蟻蜂為散以肥肉膽汁服方寸匕亦入丸散用瘡痛以淡醋和半七服立瘳

蟲止瘡腫瘡大者明見主治蛇蟻蜂為散以肥肉膽汁服方寸匕亦入丸散用瘡痛以淡醋和半七服立瘳

稀莖

唐本

校正

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

唐本

校正

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

唐本

校正

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

唐本

校正

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖

稀莖



青母生平澤下濕地所有一名虎膏一名狗膏葉似耳莖圓有毛須曰青母處處有之春生苗葉似冬葉而較長丈粗莖高二三尺秋初有花如菊結實似鴉兒果實如龍用陶器口隔青草葉似雀舌而兩枝相對莖葉俱有毛黃白五色五月六月采苗日乾時珍曰按前唐本草謂青母以青耳列為一種而成納諸藥及表言此藥與本草所定相異多生沃壤高三尺許節葉相對張鉢鉢及表言此草金根根葉葉對節而生苗葉大較葉葉頭同青耳又按沈括筆談云世人妄按地祿為大校有單服大校法乃其地祿不當用大校乃本草名謂青母者後人不識青母出條也按此數說各異而今人風痺多用編萎丸將何適後即時珍云單服大校則結實草者青耳有斑點葉似雀舌而微長似地祿而稍薄對節而生莖葉皆有細毛肥壤一株分枝數十八九月開小花洋黃色中有長子如同蜀子外黃有細刺刺入地祿則青莖圓而無刺無刺無毛葉數似松木亦不對節觀此則似與成藥二氏所說相合今河南陳州采得青充方物其狀亦似諸青草則沈氏謂編萎即諸青母者其說無疑矣蘇恭所謂似散服者乃龍葵非編萎蓋誤認而沈氏言世間單服大校乃是地祿不當用諸青母似與成藥之說相反今按諸青母條雖治風之說惟太經地祿亦有去痺除熱久服輕身耐老之語則治風似當用地祿然成張進衡之方又無虛謬之理或者二草皆有治風之功乎而今服諸青母之師者後往往有效其地祿不見有服之者則諸青之為諸青凡尤不必疑矣

狶苳氣味苦寒有小毒又曰諸青母主苦平無毒威日有小毒蘇恭曰諸青細毒誤矣主治狶苳治熱氣煩滿不能食生搗汁三合服多則令人吐

又曰諸青母主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消腫搗封之湯清散傳良蘇王公瘡瘰癧搗汁服取吐搗虎傷狗咬蜘蛛咬

蠟蚘治肝腎風氣四肢麻痺骨痛膝弱風濕諸瘡時珍曰蜀人單服狶苳五月六月九月九月九日采葉去根莖花

美然仙師本草丸服之云甚益元氣治肝腎風氣四肢麻痺骨痛腰膝無力者亦能行大腸氣諸病所說皆云性寒有小毒藥唐本同惟文州及高郵州云性熱無毒服之補益安五臟生毛髮兼主風濕痼疾肉頑瘡婦人久冷尤宜用須去粗莖留根葉花實蒸而說不同豈單用葉則寒而有毒并根花實則熱而無毒乎抑土地所產不同而然歟時珍曰生搗汁服則令人吐故云有小毒九蒸九晒則補人去痺故云無毒生則性寒熟則性溫云熱者非也懷微曰按江陵府節度使譚歸善九方表各云臣有弟譚年二十一中風伏枕五年百醫不瘥有道人鍾針因觀此患曰可餌狶苳丸必愈其草多生沃壤高三尺許節葉相對當夏五月以來收之每去地五寸剪刈以溫水洗去泥土摘淨及後頭凡九蒸九晒不必太燥但以取足為度仍舊搗為末煉蜜丸如梧子大空心酒溫或米飲下二三十丸服至



二十丸所患愈加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸得復至五千丸當復丁壯臣依法修合令計服之果如其言服後須喫飯三五匙壓之五月五日采者佳奉勅宣付醫院詳錄又知益州張詠進補益丸表畧云切以餐水飲水可作充腸之饌何松含柏亦成救病之功是以療飢者不在於羞珍愈病者何煩於異術倘獲濟時之藥輒陳鄙物之形不恥管窺輒干天聽臣因換龍興觀掘得一碑內說修養術并藥方二件依方差人訪問采覓其章頗有異金枝銀線素莖紫葉對節而生蜀號火枝莖莖頗同卷耳不費金高懸陰每常求少獲多急采非難廣收甚易倘勤久服旋見神功誰知至藥之中乃有殊常之效臣自服至百服眼目清明即至千服鬚髮烏黑筋力輕健效驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立瘥又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎斜時時吐涎臣與十服亦便得痊今合

**附方** 新風寒泄瀉 火枝丸治風氣行於腸胃泄瀉火枝草為末醋煎汁服之

一百劑差職貢史元泰進

每服二錢熱酒調下重者連服

進三服得汗妙 乾坤秋露 發汗丹 瘡癰發五葉草即五爪龍野紅花即小蘇大蒜等分

教驗 反胃吐食 火枝草焙為末家九梧子大每 附錄類鼻 別錄有名未用白味酸溫無毒主瘕瘕生田中高地葉如天名精美根

集簡方 沸湯下五十九丸 一百一選方 五月采時珍曰此似豬膏草也古今名謂或不同故附於此者耳

柴時珍曰按乾坤生意云一名牛屎柴生山野中葉類鶴虱四月開白花其葉主癰疽發背根傳之冬月用根可以盡魚

**若** 網釋名與若同 葉集時珍曰若若竹而弱故名

其生疎遠故又謂之連

集解時珍曰若生南方平澤其根與豆皆似小竹其節與葉皆似蘆荻而葉之面青背

**葉氣味甘寒無毒** 治男女吐血衄血嘔血咯血下血並燒存性溫湯服一錢之又通小便利肺氣噎痺消癰疽

疾 龍筋燒灰淋汁洗淨

經方 咽喉閉痛 葉集燈心草燒灰等分

耳勿作痛 性為末傳入耳中其疼即止

肺癰鼻血 葉集燈心草燒灰等分

白麩三錢

研勻并花水服

經方 止血不止 葉集燈心草等分為末每

服二錢米飲下

聖濟總錄 腸風便血

茶葉內善葉燒存性每服三匙空心糯米

湯下或入麝香少許

王謬百一選方

男婦血淋 亦治五淋多年

者酒瓶頭葉

三五年至十年者尤佳

每用七箇燒存性入麝香少許陳米飲

下日三服有人患此二服愈

福建者過夏月酒多有之百一選

尿白如注 小腹氣痛茶籠內善葉燒存性

入麝香少許米飲下

經方 小便澀滯

不通乾葉一兩燒

灰滑石半兩為末每



米飲服三  
錢普濟方  
男婦轉脾方  
吹乃乳癰  
五月五日樓空燒灰酒服  
瘡瘡倒壓  
張德恭症珍便覽方

盧別錄  
下品校正  
併入拾遺江  
釋名  
音律設  
加花名蓬蘽  
唐本  
音律珍白  
長成曰  
蓬蘽者  
偉大也  
蘽者色  
蘽黑也  
蘽者嘉美也  
集解  
恭曰  
蘽根生  
下

花若莢花名蓬蘽二月八月采根日乾用頭目今在處有之生下濕波澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎其根取水底味甘辛者其露出及浮水者並不堪用按郭璞注爾雅云蘽即蘽也蘽即蘽之成者莢似蘽而小中實江東呼為烏蘽音即或謂之蘽即莢也至秋堅成即謂之蘽音桓兼似佳而細長高數尺江東謂之兼其花時名另音調其萌皆名蓬蘽食如竹若然則蘽蘽通為一物也所謂兼乃今作蘽者是也所謂莢者今以當新者是也而人罕能別兼莢與蘽蘽也又北人以蘽與蘽為二物水旁下濕所生者皆名蘽其細不及指大人家池園所植者皆名蘽其幹差大深碧色者亦難得然則蘽蘽皆可通用矣時珍曰蘽蘽有數種其長大許中空皮薄色白者蘽也蘽也蘽也短小於蘽而中空皮厚色青蒼者莢也蘽也蘽也蘽也其最短小而中實者兼也蘽也皆以初生已成得其名身皆如竹其葉皆長如箭葉其入藥性味皆同其未解葉者古謂之紫蘽數日蘽根須要逆水生并黃泥肥厚者去鬚節并赤黃皮用

根氣味甘寒無毒治消渴熱止小便利別錄瘧反胃嘔逆不下食胃中熱傷寒內執彌良蘇解大執開胃治噎噦不止甄權寒熱時疾

煩悶瀉痢人渴孕婦心熱太明

笋氣味苦寒無毒治瀉瀉間客熱止渴利小便河豚及諸解毒原解諸肉毒時珍曰按雷公炮炙論序云益食加筋

味等分煎湯服蓋蘽根甘附方舊六新六骨蒸肺癰不能食者蘇遊蘽根飲主之蘽根麥門冬地骨皮生薑各十兩橘皮能益胃養能降火故也附方新六骨蒸肺癰茯苓各五兩水二斗煮八升去滓分五服取汁乃瘥外臺秘要勞復食復欲死並以汁頻飲之嘔噦不止厥逆者蘽根三斤切水煮濃汁頻飲二升必效五噎吐逆心腸氣滯煩悶不下食蘽根五兩對以水三大肘后方若以童子小便煮服不過三升愈肘后方

蘽根茅根各二兩水四升煮二升分服千金方霍亂腹脹蘽根一升生薑一升橘皮五兩水食狗肉毒心下堅或腹脹口乾急煮二升分服千金方霍亂腹脹蘽根一升生薑一升橘皮五兩水食狗肉毒心下堅或腹脹口乾急

蘽根茅根各二兩水四升煮二升分服千金方霍亂腹脹蘽根一升生薑一升橘皮五兩水食狗肉毒心下堅或腹脹口乾急







華脫落也時珍曰按萬葉南川異物志云甘蕉即芭蕉乃草類也望之如樹株大者一圍餘葉長大許廣尺餘至二尺其莖虛軟如芋皆重皮相裏根如芋魁青色大者如車轂花着莖末大如酒盞形色如蓮花子各為房實隨花長每花一圍各有六子先後相次子不俱生花不俱落也蕉子八三種未熟時皆苦溫熟時皆甜而脆味如葡萄可以療飢一種子大如母指長六七寸銳似羊角兩兩相抱者名羊角蕉利其皮黃白色味最甘美一種子大如雞卵有類牛乳者名牛乳蕉味微減一種子大如蓮子長四五寸形正方者味最弱也並可蜜藏為果又顧玠海槎錄云南海芭蕉常年開花結實有二種板蕉大而味淡佛手蕉小而味甜通呼為蕉子不似江南者花而不實又范成大廣衡志云南中芭蕉有數種極大者凌冬不凋中抽一條長數尺節節有花花褪葉根有實去皮取肉軟爛如綠柿味極甘冷四季恒實土人以飼小兒云去客熱謂之蕉子又名牛蕉子以梅汁清曝壓扁味甘酸有微霜名芭蕉乾一種難子焦小於牛蕉亦四季實一種牙蕉子小於雞蕉尤香嫩甘美惟秋初結子一種紅蕉葉瘦類蘆花色正紅如榴花日折一兩葉其中有一點鮮綠可愛春開至秋盡後猶芽俗名美人蕉一種膽瓶蕉根如土時肥飽狀如膽瓶也又嘗信星槎勝覽云南番阿魯諸國無米穀惟種芭蕉椰子取實可代糧也

**裂毒取仁食通血脈填骨髓**子五**主**食破血合金瘡解酒毒乾者解肌熱煩渴吳除小兒客熱壓丹石毒時珍

**根氣味甘寒無毒**恭曰寒頑目甘蕉芭蕉性相同也**主**治癰腫結熱別錄搏爛傳腫去熱毒搗汁服治產後血脹悶蘇黃疸子孟治天行熱狂煩消

**渴患癰毒并金石發動躁熱口乾並絞汁服之**又治頭風遊風大附方舊四新六欲飲死之芭蕉根搗爛塗肘后方**一切腫毒**方同**赤遊風癰**方同**風**

**熱頭痛**方同**風牙痛**芭蕉自然汁一梳煎熱含嗽**天行熱狂**芭蕉根搗汁飲之日華子本草**消渴飲水**骨節煩熱用生芭蕉根搗汁時飲一二合**聖惠方****血淋澀痛**芭蕉根早連草各等分水煎服

**聖惠方****產後血脹**搗芭蕉根絞汁溫服二三合**瘡口不合**芭蕉根取汁抹之良**直指方**

**蕉油**以竹筒挿入皮中取出煎成之**氣味甘冷無毒****治**頭風熱止煩渴及湯火傷梳頭止女人髮落令長而黑大明暗風癰病涎作運悶欲倒者飲

之取吐有奇效蘇頌附方新**小兒驚風**以芭蕉汁薄荷汁煎勻塗頭頂留額門金四肢留手足心勿塗甚效御筆峰雜興



葉主治腫毒初發研末和生薑汁塗之

時珍

附方

一此毒初起已發葉厚肉處存性入輕粉麻油調塗一

花主治心癰痛燒存性研鹽湯點服二錢

錢日

藋荷

別錄

自萊部移入此件人

名

藋荷

別錄

藋荷

別錄

藋荷

別錄

藋荷

別錄

藋荷

別錄

藋荷

別錄

覆其許氏說文作藋宜司馬相如上林賦作藋宜與芝無音相宜離騷大招云臨離騷解別錄曰藋草生淮南山谷頃曰藋荷則展湖江若狗猶其藋王逸注云藋草音博黃荷也見本草而今之本藋無之則脫荷亦多矣集解別錄曰藋草生淮南山谷頃曰藋荷則展湖江而肥其藋冬結根堪為蔬其性耐陰在水下生者尤美潘岳閑居賦云藋荷依陰時藋而陽是也宗懷荆楚歲時記云仲夏以鹽漬藋荷用備冬儲又以防蠹史游急就為藋藋荷冬自藏其來遠矣然有赤白二種白者入藥赤者堪啖及作梅果多用之宗更曰藋荷八九月間淹貼以備冬月作蔬果治痢止用白者時珍曰頃頃園經言荆襄江湖多種今訪之無復識者惟楊慎丹鉛錄云近京注藋荷即甘露考之本草形性相同甘露即藋荷也崔豹古今注云藋荷似芭蕉而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依陰而生又按王冕山居錄云藋荷宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其苗今死則根滋茂九月初取其舊生根以為蔬亦可醬藏十月初中以練覆其根下則過冬不至於凍死也修治數日凡使勿用華牛草凡使白藋荷以鋼刀刮去粗皮一重細切入砂盆中研如膏取自然汁鍊作膏新器攪令如乾膠狀刮取用之

根氣味辛溫有小毒

便處曰辛微溫清無毒

主治中蠱及瘧瘵汁服別錄

溪毒沙蟲毒

弘景

諸惡瘡根心主

稻麥芒入目中不出以汁注目即出

蘇恭

赤眼澀爛瘵汁點之

時珍

瘵

瘵

瘵

藋草氣味辛寒無毒

大明

主治

瘵

瘵

瘵

瘵

瘵

瘵

瘵

瘵

瘵

瘵

瘵

瘵

瘵

瘵

士先得瘵下血言中蠱其家吞以藋荷置於席下忽大笑曰蠱我者張小小也乃收小小小小走自此處藋藥多用之往往驗也周禮庶氏以嘉草除蟲毒宗懷謂嘉草即藋荷是也陳藏器云藋荷苗根為主蠱之最謂此時珍曰別錄葉部藋荷謂根也草部藋藥謂葉也

本草綱目

卷十五

草部

二



其主治亦頗相類  
近今併為一云  
**附方**  
新  
**卒中蠱毒**  
下血如雞肝晝夜不絕服散塊待死者以黃荷葉煮  
置病人床下勿令知之必自呼蘇主姓名也  
梅師方中似物吞吐不出腹脹滿瘦取白黃荷

**舌瘡**  
酒清黃荷根半日含敷其  
汁瘡乃止  
外臺秘要方  
**吐血瘁血**  
向惠黃荷根一把搗汁  
三升服之  
婦人腰痛方同  
**月信澀滯**  
黃荷根細切水煎取二升  
空心入酒和服  
經驗方  
**風冷失聲**  
咽喉

黃荷根二兩搗絞汁入酒一大  
盞和勻細服取瘥  
肘后方  
**傷寒時氣**  
溫病初得頭痛壯熱脈盛者用生薑  
黃荷葉合搗絞汁服三四升  
肘后  
**雜物入目**  
白黃荷根取一搗取汁  
滴入目中立出  
普濟方

**麻黃**  
本經  
中品  
**釋名**  
沙本  
別錄  
時珍曰  
諸名殊不可解或云其味麻其色黃未審然否張慎  
廣雅云龍沙麻黃也狗骨麻黃根也不知何以分別如此者也  
今出青州彭城華陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好禁曰鄭州鹿臺及閩中沙苑可旁沙洲上最多同州沙苑亦多其青徐者  
亦不復用焉錫臣按段成式西陽雜俎云麻黃莖頭開花小而黃叢生子如覆盆子可食頌曰今近汴京多有之以紫黃中牟者為勝春  
生苗至夏五月則長及一尺以來稍上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甜微有麻黃氣外皮紅裏仁子黑根紫赤色俗說有  
雌雄二種雌者於三月四月之內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋已後收采莖陰乾時珍曰其根皮色黃赤長者近尺也

**附錄雲花子**  
時珍曰按葛洪肘后方治馬疥有  
雲花草云狀如麻黃而中堅實也

**並修治**  
景目用之折去節根水煮汁十餘沸以竹  
片掠去上沫沫令人煩根節能止汗故也  
**氣味**  
苦溫無毒  
別錄曰微溫普曰神農雷公苦無毒局韻酸李當之平權曰甘平  
之藥入足太陽經秉走手少陰陽明時珍曰麻黃微苦而辛性熱而輕揚傳諸洪云中牟有麻黃之地久不積雪為世內陽也故選用則  
洩真氣觀此則性熱可知矣服麻黃自汗不止者以冷水浸頭髮仍用撲法即止凡服麻黃藥須避風一日不雨病惡復作也凡用須佐  
以黃芩則無赤眼之患徐之才曰  
原根白微為之使為辛夷乃草

**主治**  
中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪氣止欬逆止氣除寒熱破癰堅積聚  
本  
**五臟邪氣緩急風**

**脇痛**  
字乳餘痰止好唾通腰解肌瘦邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛  
別  
治身上毒風癰瘰皮肉不仁主壯熱溫疫山嵐瘴氣

**甄權**  
通九竅調血脉開毛孔皮膚大  
去營中寒邪澁衛中風熱  
元  
散赤目腫痛水腫風腫瘡後血滯  
時  
日麻黃療傷寒解肌第一

**權**  
通九竅調血脉開毛孔皮膚大  
去營中寒邪澁衛中風熱  
元  
散赤目腫痛水腫風腫瘡後血滯  
時  
日麻黃療傷寒解肌第一

**甄**  
通九竅調血脉開毛孔皮膚大  
去營中寒邪澁衛中風熱  
元  
散赤目腫痛水腫風腫瘡後血滯  
時  
日麻黃療傷寒解肌第一

**甄**  
通九竅調血脉開毛孔皮膚大  
去營中寒邪澁衛中風熱  
元  
散赤目腫痛水腫風腫瘡後血滯  
時  
日麻黃療傷寒解肌第一

**甄**  
通九竅調血脉開毛孔皮膚大  
去營中寒邪澁衛中風熱  
元  
散赤目腫痛水腫風腫瘡後血滯  
時  
日麻黃療傷寒解肌第一



湯及葛根湯大小青龍湯皆用麻黃治肺經上氣有射干麻黃厚朴麻黃湯皆大方也亦曰輕可去實麻黃湯根之屬是也六注有餘之邪客於陽分皮毛之間張連開拒營衛氣血不行故謂之實一藥輕清或家故可去之麻黃微苦其形中空陰中之陽入足太陽寒水之經其經循背下行本寒而又受外寒故宜發汗其皮毛氣分寒邪以泄表實若過發則汗多亡陽或飲食勞倦及雜病自汗表虛之經用之則脫元氣不可不持好古曰麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥二物雖為太陽證舉其實營衛藥也心主營為血肺主衛為氣故麻黃為手太陽肺之劑桂枝為手少陰心之劑傷寒傷風而欬嗽用麻黃桂枝即湯液之原也時珍曰麻黃乃肺經專藥故治肺病多用之張仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝應代明醫解經皆隨文傳會未竟其精微者時珍常釋思之似有一得與吾人所解不同云津液為汗汗即血也在營則為血在衛則為汗大傷寒傷營血內滯不能外通於衛衛氣閉因津液不行故無汗發熱而憎寒風傷衛衛氣外泄不能內覆於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒之邪皆由皮毛而入皮毛者肺之合也肺主衛氣包羅一身天象也是證時雖屬手太陽而肺實受邪氣其證兼面赤佛學欬嗽有痰喘而胸滿諸證若非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱內攻而肺氣贖鬱故用麻黃甘草同桂枝引中營分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加以石膏朱弦治人晝夜至後加石膏如母皆是泄肺火之藥是麻黃湯雖太陽發汗重劑實為發散肺經火鬱之藥也膝理不寒則津液外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以收表內伐肝木以防脾佐以芍藥泄水而國脾泄東所以補西也便以薑棗行脾之津液而和營衛也下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脈沉遲者加人參以益肺氣也牙痛加黃芩為陽旦湯以瀉肺熱也皆是脾肺之藥是則桂枝雖太陽解飢輕劑實為理脾散肺之藥也此千古未發之秘旨愚因表而出之又少陰病發熱脈沉有麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯少陰與太陽為表裏乃趙嗣基所謂熟附配麻黃補中有發也一錄云夏月飲酒達旦病水泄數日不止水穀直出服分利清導升提諸藥則反劇時珍診之脈浮而緩大腸下弩復發痔血此因肉食生冷茶水過難抑遏陽氣在下木盛土震素問所謂久風成泄泄也法當升之揚之遂以小續命湯投之一服而愈昔仲景治傷寒六七日大下後脈沉遲手足厥逆明喉不利之類是者也

**附方** 舊五 天行熱病 初起一二日者利唾膿血泄利不止者用麻黃湯平其肝肺兼升發之即斯理也如能神而明之則此類是者也 麻黃一大兩去節以水四升者去沫取二升去滓着米一匙及鼓為稀粥先以湯浴後乃食粥厚覆取汗即愈 又用方 傷寒霍亂 麻黃十斤去節杏仁四升去皮熬大黃一斤十二兩先以雪水五石四斗同煮至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子 傷寒黃疸 表熱者麻黃酒湯主之麻黃一把去大有病者以沸白湯五合研一丸服之立汗出不愈再服一丸封藥勿令洩氣千金方 傷寒黃疸 表熱者麻黃酒湯主之麻黃一把去汗春月用水煮 裏水黃腫 張仲景云一身面目黃腫其脈沉小便不利甘草麻黃湯主之麻黃四兩水五斗者去沫入甘草二兩者取三升煮千金方 裏水黃腫 每服一升重覆汗出不汗再服慎風寒千金云有患氣急久不瘳變成水病從腰以上腫者是宜以此發汗



**水腫** 淋瀝 少陰其脈浮者為氣虛腫者為氣非水者也麻黃附子湯汗之麻黃三兩水七升煮去

每服一匙熱酒調下至汗出為度避風 聖惠方 小兒慢脾 風因吐世後而成麻黃長五寸十箇去節白木指面大二塊全蠍二箇生

烟筒中重之 聖惠方 產後腹痛 血下不盡麻黃去節為末酒服方寸匕 心下悸痛 半夏麻黃丸用半夏麻黃等分末之煉蜜丸

復出也一法用無灰酒煎其效更速仙傳神筆工李用之子病斑瘡風寒倒屣已困用此一服便出如神 中風諸病 麻黃一秤去根以王

水三斗三石以淨錦盛五斗先煮五沸去沫遂投冷水盡至三五斗流去麻黃澄定濾去滓取清再熬至一斗再澄再濾取汁再教

至升半為度密封收之一二年不妨每服一二匙熱湯化下取汗熱時要動擾勿令着底恐焦子仍忌雞犬陰人見之此劇守真秘方也

**根節氣味甘平無毒** 治汗夏月難粉撲之弘景發明 麻黃根節止汗以故竹筒梓木同撲之又牡蠣粉粟粉并麻黃根等分

根節止汗效如影響物理之妙不可測度如此自汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽者度諸證皆可隨證加

而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤捷蓋其性能行周身肌表故能引諸藥外至衛分而固膜理也本草但知撲之之法而不知服

解之功附方 盜汗陰汗 麻黃根牡蠣粉為末撲之 盜汗不止 麻黃根微目等分為末每末一錢無灰酒下 小兒盜汗 麻黃根三分故蒲扇灰一分為

尤良也附方 盜汗陰汗 麻黃根牡蠣粉為末撲之 盜汗不止 麻黃根微目等分為末每末一錢無灰酒下 小兒盜汗 麻黃根三分故蒲扇灰一分為

度 試驗 諸虛自汗 夜臥即甚久則枯瘦甚良麻黃根各一兩牡蠣末油浸洗 虛汗無度 麻黃根黃芪等分為末飛麵糊作丸 糯米同為末三分 撲之 有驗 諸虛自汗 煩過為散每服五錢水二盞小麥百粒煎服和濟局方 虛汗無度 梧子大每用浮麥湯下百丸以止為

南京相國寺東黑孩兒方也 普濟



錫曰木賊出秦隴華成諸郡近水地苗長尺許叢生每根一輪無花葉寸寸節色青凌冬不凋四月采之須曰所在近水地有之采無時今用甚多時珍

目疾還翳膜消積塊益肝膽療傷風止痢及婦人月水不斷  
 崩中赤白赤白解肌止淚止血去風溫屈痛

時珍曰出錫曰木賊竹青角膜膚者治休息久痼得高餘熱當歸能治脂中赤白得視蛾桑耳治脇風下血得視子枳殼治疥疾也魯實子曰木賊去即熱渴發汗至易本草不言言及時珍曰木賊氣溫味甘苦中空而輕陽中之陰升也浮

目昏多淚 木賊去節 蒼朮 湯浸各一兩為末  
 每服二錢茶調下或蜜丸亦可  
 急喉痺塞 木賊以牛糞火燒存性 每冷  
 服一錢血出即安也 聖惠方

前濕服為止方同上日二易下血多年不止用木賊視穀名二兩乾薑一斤大  
服廣利方月黃二錢半並於銚內炒黑存性為末每粟米

婦人血崩氣痛不可忍遠年近日不瘥者雷氏木賊散主之木賊一兩香附

月水不調 斷入煎炒三錢水一盞煎去  
分溫服日一服 聖靈方 月重不安 木賊去節川芎等分益末每服三錢  
水一盞入金銀一錢煎服 聖濟總

義  
服一錢  
聖惠方  
附錄  
氣急者汁服之生伊沒洲諸間茹木

本草經別錄唐李時珍曰別錄云此草生水

上龍青龍經音注  
音武修音彭經字餘  
音龍經字目才房錄云玉鑑石之處可以列東蒼馬故謂之龍

名廣之廣州仙都山此草因以名之崔豹古今注云昔黃帝龍上天厚臣樂毅射墜地生草名曰龍墜者誤也江東以草織席名



西王母席亦宣西王集解別錄曰石龍參生洛州山谷澤地五月七月采莖暴乾以九節多味者良弘景景實細相連實亦今出近道水母附虎而隨其類子石處似東陽龍以作席者但多節爾藏器曰今出汾州沁州石州亦處處有之係昇曰最生莖如蛇所在有之俗名龍草可為席八月九月采根其乾時珍曰龍草生狀如幹心草及虎尾草而直上夏月莖端開小穗花結細實莖無枝葉今吳人多裁席緣席使處自生者不多也本經明言龍草一名龍草而陶弘景言龍草似龍草但多節似以為二物者非矣

並氣味苦微寒無毒別錄主治心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼瘕毒久服積虛羸瘦身目聰明延年補內虛不足虛滿身

無潤澤出汗除華熱痛癢蛇蟲腫不消食別錄

敗席主治夢小便不通彌敗有垢者乃煮汁服之藏器

龍常草別錄有華名龍草時珍曰俗五月采根集解時珍曰生河水旁狀如龍易冬夏生時珍曰按爾雅云輝龍荒也鄭雅解名未用華名龍草時珍曰俗五月采根集解時珍曰生河水旁狀如龍易冬夏生時珍曰按爾雅云輝龍荒也鄭雅解

類之小者爾故其功用亦相近云

並氣味鹹溫無毒治輕身益陰氣癰疽寒濕別錄

燈心草宋開寶釋名燈心草綱目別錄曰燈心草生江南澤地叢生莖圓細而長直人將為席常藥曰陝西亦有之時珍乾

且此即龍腦之類但氣味小而無實此草稍粗而熟皮白矣人裁將之取藕為燈柱以草織席及簾他處野生者不多外丹家以之伏硫砂雷公炮炙論序云確遇赤脂水留金帛注云赤脂亦呼虎膽草者燭住火不知即此虎膽草也

並及根修治時珍曰燈心雖所以糗米粉煑其毒氣味甘寒無毒元素曰辛甘陽

肺陰發滯不利行水除水腫癰閉治治喉痺煙吹之甚種煙灰塗乳上飼小兒止夜啼降火心止血通氣散腫止渴燒灰入輕



粉麝香治陰

時珍

附方舊一破傷出血

燈心草

勝金方

血血不止

燈心一兩為末入升砂一錢

米飲每服二錢

聖濟總錄

喉風痺塞

瑞竹堂方

用燈心一握陰陽

有燒存性又炒鹽一匙每吹

拾數次立愈

一方用燈心灰二錢連砂末一錢吹之

一方燈心

燈心草

燈心草

燈心草

燈心草

燈心草

燈心草

燈心草

燈心草

燈心草

燈心草

煎湯代茶飲即

通利水道

白飛霞自制天一丸用燈心十斤米粉漿染晒研末入水澄去粉取淨者晒乾二兩五錢赤白茯苓去皮共

得睡集簡方

五兩滑石水煎五兩猪苓二兩澤瀉三兩人參一斤切片熬膏和藥丸如龍眼大硃砂為衣每用一丸任病換

引大段小兒生理向上本天一生水之妙

濕熱黃痘

燈草根四兩酒水各半入瓶內

諸病以水道通利為捷徑也

韓氏醫通

者半日露一夜溫服

集玄方

集玄方

燈花燼

見火部



本草綱目草部第十五卷終



本草綱目草部目錄第十六卷

草之五 限草類下七十三種

地黃本經胡  
面茶附

牛膝本經

紫苑本經

女苑本經

麥門冬本經

萱草嘉祐

槌胡根拾遺

淡竹葉綱目

鴨掌嘉祐即  
作葉茶

冬葵本經

蜀葵嘉祐

夷葵唐本

黃蜀葵嘉祐

龍葵唐本

龍珠拾遺

酸漿本經即  
俗龍草

蜀羊泉本經

鹿蹄草綱目

敗醬本經即  
苦菜

迎春花綱目

欽之花本經

鼠麴草月華即米  
麴佛耳草

决明本經

地膚本經即  
落帚

瞿麥本經

王不留行別錄

剪春羅綱目

金盞草綱目

薏苡本經

車前本經

狗舌草唐本

馬鞭草別錄  
即龍牙

蛇含本經

女青別錄

鼠尾草別錄

狼把草開寶

狗尾草綱目

鯉腸唐本即  
旱蓮草

連翹本經

陸英本經



葫蘆 別錄

水英 圖經

藍 本經

藍澱 綱目

青黛 開寶 拾遺 通附

甘藍 拾遺

蓼 本經

水蓼 唐本

馬蓼 綱目

藍草 別錄

毛蓼 拾遺

海根 拾遺

水炭母草 圖經

三百草 唐本

牡蠣草 拾遺

蛇蘭草 拾遺

虎杖 別錄

猶草 拾遺

篇蓄 本經

葦草 本經

蒺藜 本經

穀精草 開寶

海金沙 嘉祐

地楊梅 拾遺

水楊梅 綱目

地蜈蚣 綱目

半邊蓮 綱目

紫花地丁 綱目

兒鉞草 拾遺

獨用將軍 唐本 留軍待附

見腫消 圖經

攀倒甌 圖經

水草 圖經

右附方舊一百七十一新二百九十一



本草綱目草部第十六卷

草之五 隰草類下七十三種

地黃

本經上品

音起

地黃者次之浮者不堪時珍曰爾雅云平地黃郭璞云江東呼為羊羅願云羊以沈下珍為貴故字從下

別錄曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰乾景曰咸陽即長安也生渭城者乃有子實如小麥今以彭城地黃最好次歷陽近用江甯板橋者為勝作乾者有法搗汁和蒸殊用意而此云陰乾恐以蒸作為失乎人亦以牛膝姜糖作之人不能別須白今處處有之以同州者為上二月生葉布地便出如葉前葉上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翅中子甚細而沙褐色根如人手指通黃色粗細長短不常種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中為壇壇上又以葦席實土為一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠乃以地黃根節多者寸斷之蒔壇上層層今滿逐日水灌令茂盛至暮秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斷傷故也得根暴乾出同州者光潤甘美亦與曰地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛奶子花葉有微細短白毛時珍曰今人惟以懷慶地黃為上亦各處隨時興廢不同爾其初生塌地葉如山白菜而毛濤葉面深青色又似小芥葉而頗厚不又了葉中微莖上有細毛莖稍開小筒子花紅黃色結實如小麥粒根長四五寸細如手指皮赤黃色如羊蹄根及胡蘿蔔根曝乾乃黑生食作土氣俗呼其苗為婆婆奶古人種子今惟種根王曼山居錄云地黃嫩苗摘其葉葉作菜甚益人本草以二月八月採根殊未窮物性八月殘葉猶在葉中積氣未盡歸根二月新苗已生根中積氣已溢於葉不如正月九月採者殊好又與蒸曝相宜禮記云羊芋家藏則自古已食之矣嘉謨曰江浙壤地種者受南方陽氣質雖光潤而力微懷慶山產者稟北方純陰皮有疙瘩而力大

乾地黃

本經上品

音起

乾地黃者即生地黃之乾者也其法取地黃一百斤擇肥者六十斤洗淨晒令微皺以揀下者洗淨木臼中搗絞汁盡投酒

更搗取汁拌前地黃日中晒乾或火焙乾用

氣味甘寒無毒

別錄曰苦權曰甘平好古曰甘苦寒氣薄味厚沉而降陰也入手足少陰厥陰及手太陽之經酒

浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同元素曰生地黃大寒實弱者斟酌用之恐損胃氣之

才曰得清酒參門冬良慈貝母畏無美權曰慈絲繭薑諸血令人營衛溫弱髮白黧曰忌銅鐵器

令人腎消并髮白男損營女損衛時珍曰薑汁浸則不泥膈酒制則不妨鮮用則寒乾用則涼

治傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯

本經上品

音起

地黃者次之浮者不堪時珍曰爾雅云平地黃郭璞云江東呼為羊羅願云羊以沈下珍為貴故字從下

別錄曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰乾景曰咸陽即長安也生渭城者乃有子實如小麥今以彭城地黃最好次歷陽近用江甯板橋者為勝作乾者有法搗汁和蒸殊用意而此云陰乾恐以蒸作為失乎人亦以牛膝姜糖作之人不能別須白

今處處有之以同州者為上二月生葉布地便出如葉前葉上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翅中子甚細而沙褐色根如人手指通黃色粗細長短不常種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今

不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中為壇壇上又以葦席實土為一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠乃以地黃根節多者寸斷之蒔壇上層層今滿逐日水灌令茂盛至暮秋分時自上層取之根皆長大而不斷折

不被斷傷故也得根暴乾出同州者光潤甘美亦與曰地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛奶子花葉有微細短白毛時珍曰今人惟以懷慶地黃為上亦各處隨時興廢不同爾其初生塌地葉如山白菜而毛濤葉面深青色又似小芥葉而頗厚不

又了葉中微莖上有細毛莖稍開小筒子花紅黃色結實如小麥粒根長四五寸細如手指皮赤黃色如羊蹄根及胡蘿蔔根曝乾乃黑生食作土氣俗呼其苗為婆婆奶古人種子今惟種根王曼山居錄云地黃嫩苗摘其葉葉作菜甚益人本草以二月八月採根殊未窮

物性八月殘葉猶在葉中積氣未盡歸根二月新苗已生根中積氣已溢於葉不如正月九月採者殊好又與蒸曝相宜禮記云羊芋家藏則自古已食之矣嘉謨曰江浙壤地種者受南方陽氣質雖光潤而力微懷慶山產者稟北方純陰皮有疙瘩而力大

乾地黃者即生地黃之乾者也其法取地黃一百斤擇肥者六十斤洗淨晒令微皺以揀下者洗淨木臼中搗絞汁盡投酒

更搗取汁拌前地黃日中晒乾或火焙乾用

氣味甘寒無毒

別錄曰苦權曰甘平好古曰甘苦寒氣薄味厚沉而降陰也入手足少陰厥陰及手太陽之經酒

浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同元素曰生地黃大寒實弱者斟酌用之恐損胃氣之

才曰得清酒參門冬良慈貝母畏無美權曰慈絲繭薑諸血令人營衛溫弱髮白黧曰忌銅鐵器

令人腎消并髮白男損營女損衛時珍曰薑汁浸則不泥膈酒制則不妨鮮用則寒乾用則涼

治傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯



除寒熱積聚除痺癢折跌絕筋久服輕身不老生者尤良

經本

主勇士五勞七傷孝傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸黃中宿食

飽大齒紀補五臟六傷不足通血脈無刀利耳目

錄

助心胆氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸勞傷肺損吐血鼻衄婦人崩中血運

大產後腹痛久服變白延生

權甄

原血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸濕熱

素元

主病掌中熱痛脾氣痿蹶嗜卧足下熱而痛

古好

治諸痛

唾血生地黄主治大寒治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮跪折瘀血留血鼻衄吐血背傷飲別

諸執通月水利水道擣貼心腹能消瘀血

豐登

明好古曰生地黃人手少陰又為手太陽之劑故錢仲陽瀉丙火與木通同用以導赤也

戴原禮曰陰微陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬為虛火之證者宜地黃之屬以滋陰陽宗素曰本經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛熱者若與生苧當意大寒後後宜用滋陰熟者與一而末之

宗奭曰本經曰言乾生二種不言孰者

蓋者乃陰乾日乾火乾者故又云生者尤良別錄復云生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒其熟地黃乃後人復蒸晒者諸家本草皆指乾地黃爲熟地黃雖主治證同而涼血補血之功稍異故今別出熟地黃一條以示

黃者乃陰乾曰乾火乾者故又云生者尤良別錄復云生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒其熟地黃乃後人復蒸晒者諸家本草皆指乾地黃為熟地黃雖主治證同而涼血補血之功稍異故今別出熟地黃一條於下

皇明珍本經所謂乾地

熟地黃

四

時時浸漚蒸乾又暴便汁盡其地黃當火黑如漆味甘平但宜晚服收之以其脂太喜聞人故因之

去皮鐵鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛也時珍曰近時流俗去揀取沈水  
肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透乾再以沙二酒半蒸良口八九熟良乃止也○貢生倪時

去皮鐵鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛也時珍曰近時流俗去揀取沈水  
肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透乾再以沙二酒半蒸良口八九熟良乃止也○貢生倪時

去皮鐵鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛也時珍曰近時流俗去揀取沈水  
肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透乾再以沙二酒半蒸良口八九熟良乃止也○貢生倪時

去皮鐵鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛也時珍曰近時流俗去揀取沈水  
肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透乾再以沙二酒半蒸良口八九熟良乃止也○貢生倪時

之膏而竄合和五臟冲和之氣歸宿丹  
故也今市中惟以酒煮孰售者不可用

氣

味甘微苦寒假酒力晒蒸則微溫而大補厚氣薄陰中之陽沈

之香而實合和五臟沖和之氣歸宿丹田  
也今市中惟以酒煮熟售者不可用  
氣味甘微溫無毒  
元素曰甘微苦寒假酒力晒蒸則微溫而大補味厚氣淳陰中之陽伏  
入手至少金匱雲之聖治上焦酒型之惡風氣赤者且得土丹

及當歸和血生肌  
涼血滋陰補髓



右填骨肉髓養筋生精血補五臟內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞傷女子傷中胞漏經候不調胎產

治填骨肉 鬣其肌精血補五臟內傷不足通血脈利耳目黑鬣髮男子五勞傷女子傷中胞漏經候不調胎產

百病時

補血氣滋腎水益真陰去臍腹急痛病後腰膝酸痛元  
 素白地黃生則大寒而涼血血熱者

病時  
 補血氣  
 滋腎水  
 益真陰  
 去臍腹  
 急痛  
 病後  
 腹脹  
 酸痛  
 元氣  
 虛弱  
 欲起  
 目眩  
 無所  
 見好  
 方明  
 元氣  
 素旺  
 地黃  
 生則  
 大寒  
 而  
 涼血  
 血熱  
 者

好

元素曰地黃生則大寒而涼血血熱者

病時  
 補血氣  
 滋腎水  
 益真陰  
 去臍腹  
 急痛  
 病後  
 腹脹  
 酸痛  
 元氣  
 虛弱  
 欲起  
 目眩  
 無所  
 見好  
 方明  
 元氣  
 素旺  
 地黃  
 生則  
 大寒  
 而  
 涼血  
 血熱  
 者



之及臍下痛屬腎經非熱地黃不能除乃通腎之藥也好古曰生地黃治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能益腎水涼心血其脈洪實  
 者宜之若脈虛者則宜熱地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六味丸以之為諸藥之首天一所生之源也湯液四物湯治藏血  
 之臟以之為君者癸巳同歸一治也時珍曰按王頌易簡方云男子多陰虛宜用熱地黃女子多血熱宜用生地黃又云生地黃能生精  
 血天門冬引入所生之處熱地黃能補精血用麥門冬引入所補之處虛損醫學正傳云生地黃生血而胃氣弱者服之恐防食熱地黃  
 補血而痰飲多者服之恐泥膈或云生地黃酒炒則不妨胃熱地黃薑汁炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者也頃曰崔元亮海上方  
 治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少為絞取汁搜麝作餅或冷淘食良久當利出虫長一尺許頭似蟹舌後不復患  
 矣昔有人患此病二年深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本從其言果得虫置於竹節中每所食皆飼之因食地黃經託亦與  
 之隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂絕遂作地黃冷淘食便吐一物可方寸七狀  
 如蟻蟻無足目似有附方舊十三新服食法地黃根淨洗搗絞汁煎令稠入白蜜更煎令可丸丸如梧子大每晨溫酒送下三十九日三  
 口遂愈冷淘勿着鹽附方五十一服食法地黃根淨洗搗絞汁煎令稠入白蜜更煎令可丸丸如梧子大每晨溫酒服一丸日二服  
 朴子云楚文子服地黃補虛除熱治吐血唾血取乳石去癰癰等疾生地黃不拘多少三搗三壓取汁令盡以瓦器地黃煎生地黃  
 黃八年夜視有光地黃煎盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如錫九彈子大每溫酒服一丸日二服千金地黃煎十斤洗  
 淨搗取汁鹿角膠一斤半生薑半斤絞取汁蜜二升酒四升文武火煮地黃汁數沸即以酒研紫蘇子地黃粥大能利血生精地黃切  
 四兩取汁入煎一二十沸下膠膠化下薑汁蜜再煎候稠瓦器盛之每空心酒化一匕服大補益同上地黃粥二合與米同入罐中煮  
 之候熟以酥二合蜜乙合同炒地黃酒見投部瑤膏常服開心益智髮白返黑落髮更生辟穀延年治癰疽瘡癤瘰癧等病乃鐵  
 香入內再煮熱食臍仙神隱地黃酒見投部瑤膏常服開心益智髮白返黑落髮更生辟穀延年治癰疽瘡癤瘰癧等病乃鐵  
 十斤濾淨拌勻入瓶內密封安砂鍋中桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取起再煮一伏時每以白湯或酒點服一匙再添  
 云好色虛人欲嗽唾血者服之甚捷國朝太醫院進御服食議加天門冬麥門冬枸杞子末各一斤賜名益壽永貞服仙方加琥珀  
 沉香明目補腎生半熟羊各二兩川椒紅一兩為末蜜丸梧子大每空三溫湯下三十九普濟方固齒齦一治齒痛二生津液三變白鬚其功極妙地黃五斤柳木甑內以  
 半兩男女虛損或大病後或積勞後四體沈滯骨肉酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾唇燥或飲食無味多卧少起久者虛勞因之  
 地黃一石取汁酒三斗攪勻煎收日服必效方病後虛汗口乾心躁熱地黃五兩水三盞煎骨蒸熱張文仲方用生地黃一升搗三度絞盡分婦人發熱欲  
 勻煎收日服必效方病後虛汗一盞半分三服一日盡聖惠方再服若利即減之以涼為度外臺秘要女婦人發熱欲



勞病肌瘦食減經候不調地龍煎用乾地黃一婦人勞熱心松地黃煎用生乾地黃熟地黃等分爲末生薑自然汁入水相和打糊丸  
斤爲末煉蜜丸梧子大每酒服五十九丸保慶集  
晨服八味丸地黃性冷壞脾陰虛則  
發熱地黃補陰血故也 婦人良方  
**嗽吐血** 勞瘵骨蒸日晚寒熱生地黃汁三合煮白粥  
臨熟入地黃汁攪勻空心食之 食醫心鏡  
**吐血** 熟地黃末酒服一  
黃汁

一升二合白膠香二兩以磁器  
盛入煎令膠消服之 梅師  
**肺損吐血** 或舌上有孔出血生地黃八兩取汁童便  
五合同煎熟入鹿角膠炒研一兩分三服  
**熱吐血** 服洪數者生半升升熱至一合入大黃  
至十丸 並  
聖惠方

**鼻出血** 乾地黃地龍薄荷等分爲末  
冷水調下 孫兆秘寶方  
**吐血** 地黃汁六合銅器煎沸八牛皮膠一兩待化入薑  
汁半盆分三服便止或微轉一行不妨 聖惠方  
**腸風下血** 生地黃熟地  
黃並酒浸五

味子等分爲末以煉蜜丸梧子  
大每酒下七十丸 一百一選方  
**初生便血** 小兒初生七八日大小便血出乃熱傳心肺不可服涼藥只  
以生地黃汁五七匙酒半匙磨單匙和服之 全幼心鑑  
**小便尿血** 吐血及耳鼻出血生地  
黃汁半升生薑汁半合

蜜一合和服  
**小便血淋** 生地黃汁車前葉汁各  
三合和煎服 聖惠方  
**小兒蟲痢** 生半汁一升二合分三  
四服立効 子母秘錄  
**月水不止** 生地黃汁每服一盞酒一  
盞煎服日二次 千金方  
**月經不調** 久而無

任伏熱也熟地黃半斤當歸二兩黃連一兩並酒浸一夜焙研  
爲末煉蜜丸梧子大每服七十丸米飲溫酒任下 禹講師方  
**妊娠漏胎** 下血不止百一方用生地黃汁一升漬酒四合煮三五沸服之  
不止又服 崔氏方用生地黃爲末酒服方寸匕日一夜一

經心錄加乾薑爲末 保命集  
黃丸用生地黃熟地黃  
等分爲末每服半兩白木和煎服湯空心調下日二服  
**產後血痛** 有塊并經脈行後腹痛不調黑神散用熟地黃一斤陳  
動白一枚攪服 聖惠方  
生薑半斤同炒乾爲末每服二錢溫酒調下婦人良方  
**產後惡血** 不止乾地黃搗末每食前熱酒  
服一錢連進三服 瑞竹堂方

**產後中風** 腸不得轉交加散用生地黃五兩研汁生薑五兩取汁交互相浸  
一夕次日各炒黃浸汁乾乃焙爲末每酒服一方寸匕濟生方  
**產後煩悶** 乃血氣上冲生地黃汁清酒各一  
升相和煎沸分二服 集驗方  
**產後百病** 地黃  
酒用

地黃汁漬麴二升淨林米二斗令發如常釀之至熟封七日取清常服令相接  
尾生冷鮮蘇雞猪肉一切毒物未產先一月釀成夏月不可造 千金翼方  
**胞衣不出** 生地黃汁一升苦酒三  
合相和燉服 必效方  
**寒疝絞痛** 來去角烏雞  
法生地黃七斤剉細甑中同蒸下以銅器承取汁清旦服至日晡  
令盡其間當下諸寒澀訛作白粥食之久在者作三劑 肘後方  
**小兒陰腫** 以葱椒湯煖處洗之唾調地黃末傳之外腎  
熱者雞子清調或加牡蠣少許 危氏方  
**小兒熱病** 壯熱  
煩渴



頭痛生地黄汁三合蜜半合  
和勻時時服 普濟方  
熱喝亮 地黃汁一熱瘡自  
煩悶飲水不止至危者一服見效生地黄根生薄荷等分搗爛取

狂黑膏治溫毒發斑喝逆生地黄二兩六錢二字半好豆豉一兩六錢二字半以猪膏十兩合之露一  
夜煎減三分之一絞去滓入雄黃麝香如豆大搜勻分作三服盡從虛中出則愈忌熱食 千金方  
血熱生癰 地黃汁頓服  
之 千金方  
疔腫乳癰

地黃搗敷之熱即易性涼  
消腫無不效 梅師方  
癰瘡 地黃三斤水一斗煮取三升去滓煎  
一切癰疽及打撲傷損未破疼痛者以生地黄杵如泥攤在上  
捺木香末於中又攤地黃泥一重貼之不過三五度

即內消也 丁義昌  
骨碎及筋傷爛用生地黄黃膏裹之以竹簡編束急縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘡  
王襄博濟方打撲傷 骨碎及筋傷爛用生地黄黃膏裹之以竹簡編束急縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘡  
類說云許元公過

痛止痛處已白日日換貼其累腫移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈即上方也  
出肘後 物傷 輕者驗胞腫痛重者目睛突出  
恒目系未斷者即納入急搗生

方中 損傷打撲瘀血在腹者用生地黄汁三升酒一升半煮二升半分三服  
出千金方  
傷 輕者驗胞腫痛重者目睛突出  
恒目系未斷者即納入急搗生

地黃綿裹得之仍以避風膏 聖起目赤 腫起良久如常者血熱也卧則歸於肝故熱則目赤腫良久血散故如常也用生地黄汁  
浸梗米半升晒乾三浸三晒每夜以米煮粥食一盞數日即愈有人病此用之得效醫餘眼暴赤

痛水洗生地黄黑豆各二兩搗膏卧時以鹽湯洗目  
聖濟總錄 毒內赤目 浸貼 小口方  
牙疳 膿血口氣生地黄一斤鹽二合末自搗和  
以麝香煨令烟斷去麝入麝一分研勻日夜

貼之 牙齒長 出一分者常啗生地黄  
聖濟總錄 甚妙 張大仲備急方  
牙動 兒生地黄黃綿裹唾之令汁清根  
食 膿血口氣生地黄一斤鹽二合末自搗和  
以麝香煨令烟斷去麝入麝一分研勻日夜

常鳴 生地黄黃綿裹耳中日數易 髮黃赤 生地黄一斤生薑半斤各洗研自然汁留滓用不乾皂角十條去皮弦鹽汁炙至汗盡為度  
同滓入灌內泥固煨存性為末用鐵器盛末三錢湯調停一日臨卧刷須髮上即黑本

事竹木入肉 生地黄黃綿裹 毒入肉 煎生地黄汁作丸服至  
百日箭出 千金方  
獐犬咬傷 地黃搗汁飯餅塗  
之救急方 之百度愈百一方

葉主 治惡瘡癰十年者搗爛日塗湯洗 千金方  
時珍曰按抱朴子云韓子治用地黃黃面喂五十歲老馬生三駒一百三十歲乃  
死 張鷟謂野食截云雄被鷹傷脚地黃黃點之虎中樂前食青泥解之鳥獸知解毒

寶主 治月樑陰乾搗末水服方寸七日三服功與地黃等  
蘇頌曰出渭城者  
有子淮南七情丸用之



花主為末服食功同地黃黃頭腎虛腰脊痛為末酒服方寸匕日三服附方一內障膏風赤生翳及重眼日久瞽損失明地黃花晒黑豆花晒槐花晒各一兩為末猪肝一具同

以水二斗煮至上有凝脂掠盡收每點少許三四次聖惠方附錄胡面華冷氣止腹痛煮服生絹南葉如地黃

牛膝本經上品性平味甘微寒補之功如牛之多力也其葉似莧其節對生故俗有山莧對節之稱集解別錄曰

河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾昔曰葉如夏葉本亦曰景曰今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節莖葉節大者為雄青細者為雌以雄為勝大明曰懷州者長白蘇州者莖葉細曰今江淮閩粵關中亦有之然不及懷慶者為真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝及牛膝頭莖葉圓如匙兩兩相對於節上生花作穗狀結實甚細以根極長大至三尺而柔潤者為佳莖葉亦可單用時珍曰牛膝處處有之謂之土牛膝不堪服食惟北土及川中人家栽蒔者為良秋間收子至春種之其苗方莖葉節葉皆對生頗似莧菜而長且其葉秋月間花作穗結子狀如小鼠負虫有濡毛皆貼莖倒生九月末取根水中浸兩宿投去皮裏葉暴乾雖白直可貴而按去白汁入藥不如留皮者力大也嫩苗可作茶如

根性平味甘微寒補之功如牛之多力也其葉似莧其節對生故俗有山莧對節之稱集解別錄曰

治寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛膝胎久服輕身耐老本經經療傷中少氣男子陰滑老人失溺補中續也益精利

氣填骨髓止衰白除腦中痛及腰脊痛婦人月水不調血結治陰痿補腎助十二經脈逐惡血治腰膝軟怯弱破癥結排膿止痛產

後心腹痛并血運落死胎明大強筋補肝臟風虛好古同從發浸酒服益腎竹木刺入肉嚼爛卷之即出宗治久瘡寒熱五淋尿血莖中痛下

痢喉痺口瘡齒痛癰腫惡瘡傷折時珍曰權曰病人虛羸者加而用之牛膝能引諸藥下行筋骨痛風在下者宜加用之凡用土

酒則能補肝腎生用則能去惡血二者而已其治腰膝骨痛足痿陰消失溺久瘡傷中少氣諸病非取其補肝腎之功歟其瘡癰心腹諸痛癰腫惡瘡金瘡折傷喉齒淋瀝尿血經候胎產諸病非取其去惡血之功歟按陳日華經方云方表吾所編集要方予刻之臨汀後







日三服  
肘後方眼生珠管  
牛膝并其湯汁日  
點三四次聖惠方

# 紫苑

本經  
中品經書

錄別錄  
紫苑  
返魂草  
目夜牽牛

時珍曰其根色紫而赤宛故名許慎  
說文作紫苑斗門方謂之返魂草

集解

二月三月採根陰乾弘景曰近道處處有之

其生布地花紫色本有白毛根甚不細有白者名白苑不復用天明曰形似重臺根作節紫色潤軟者佳頃曰今體成四等台孟興國諸  
州皆有之三月內布地生苗其葉二四相連五月六月內開黃白紫花結黑子餘如陶說紫曰白苑即女苑也療瘰癧紫苑相同無紫苑  
時亦用之顧曰紫苑連根葉採之醋浸入少鹽收曬作家辛香號名仙紫鹽不宜多則腐也時珍曰按陳自明云紫苑以牢山所出根如  
北細辛者為良近見以東皆有之今人多以東前旋復根赤上導過偽之紫苑肺病要藥肺本自亡津液又服走津液藥為害滋甚不可  
慎不

# 根脩治

嚴曰凡使先土氣有白如練色者號白羊鬚草自蒸不同去頭及上  
用東流水洗淨以蜜浸一宿至明控火上焙乾用一兩用蜜二分

氣味苦溫無毒

別錄曰羊鬚曰苦平之才曰欬又為之  
使是天雄根也本雷大遠志思爾康

治欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒瘰癧五臟本  
經療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇別治疰瘵瘵氣勞氣虛氣白

# 邪鬼魅

權調中消痰止渴潤肌膚添骨髓大  
益肺氣意貴

好附方

舊三

肺傷欬嗽

紫苑五錢水一盃煎七分溫

服日三次

衛生易簡方

久嗽不瘥

紫苑冬花

各一兩白部

半兩搗羅為末每服三錢薑三片烏梅  
一個煎湯調下日二甚佳

圖經本草

小兒欬嗽

聲不出者紫苑末杏仁等分入蜜同研丸

子大每服一丸五味甘子湯化下

全幼心鑑

吐血欬嗽

吐血後欬者紫苑五味炒為末

蜜丸芡子大每含化一丸指南

# 方

產後下血

紫苑末水服五

聖惠方

經喉風痺

不通欲死者用近魂草根一莖洗淨納入喉中待取惡涎出即瘥神效

婦人小便

聖不得出者紫

苑為不并單水

服三撮即通小便血者

服五撮立止

千金方

# 女苑

本經

中品經書

別錄

女苑

廣音柳時珍曰其根

似女苑

方無復用之復有白苑似紫苑恐非此也

本經曰女苑有名朱

苑

苑

苑

苑

苑

苑

苑

苑

苑







氣傷中傷飽胃終絕羸瘦短氣久服輕身不老不饑本經療身重胃虛心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹶強陰益精消穀調

中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色有子別錄去心熱止煩熱寒熱體勞下疲飲藏器治五勞七傷安魂定魄定嗽定肺痿吐膿時疾熱

狂頭痛明治熱毒大水面目肢節浮腫下水主消精類權治肺中伏火補心氣不足主血妄行及經水枯乳汁不下元素久服輕身明目和車

前地黃丸服去濕痺變白夜視有光藏器斷穀為要藥引治肺熱之功為多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服治

子枸杞子同為生脉之劑完素曰麥門冬治肺中伏火脉氣欲絕者知五味子人參三味為生脉散補肺中元氣不足梁曰六七月間濕

熱方旺人病骨乏無力身重氣短頭眩眼黑甚則痿軟故孫真人以生脉散補其天元真無脉者人之元氣也人參之甘寒濕熱火而益

元氣麥門冬之苦寒滋燥金而清水源五味子之酸溫瀉火而補庚金兼益五臟之氣也時珍曰按趙繼宗儒醫精要云麥門冬以地

黃為使服之令人頭不白補髓通腎氣定喘促令人肌體滑澤除身上一切惡氣不潔之疾蓋有君而有使也若有君無使是獨行無功

矣此方惟火盛氣壯之人服之相附方舊三麥門冬煎補中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚駛取新麥門冬根去心搗熟絞汁

宜若氣弱胃寒者必不可餌也附方新九和自蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴及成溫酒日日化服之圖經本草

消渴飲水用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二大兩去兩頭共三五節小刀子調理去皮毛了吹去塵更以生布摩

再但服兩日其渴必定若重者即初服一百五十丸二日服一百二十丸三日一百丸四日八十九丸五日五十丸合藥要天無晴明之夜

方浸藥須淨虛禁婦人雞犬見之如覺可時又服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚治淨以水三大斗煮爛取汁一斗以來細細飲

之勿食肉勿入鹽不過三劑平勞氣飲絕麥門冬一兩甘草炙二兩糯米半合夏二枚竹葉虛勞客熱麥門冬煎湯頭

復也崔元亮海上集驗方勞氣飲絕十五片水二升煎一升分三服南陽活人書虛勞客熱飲本單行義吐血衄血諸方不

門冬去心一片搗取自然汁入蜜刀麥門冬去心生地黃各五錢麥門冬煎湯漱咽喉生瘡脾肺虛熱上攻也麥門冬一

二合分作二服即止活人心統血不止麥門冬去心生地黃各五錢麥門冬煎湯漱咽喉生瘡脾肺虛熱上攻也麥門冬一

子大海服二十丸麥麥門冬去心焙為末每用三錢酒磨厚角約一下利渴引飲無度麥門冬去心三兩烏梅肉二十箇

門冬湯下普濟方乳汁不下麥門冬去心焙為末每用三錢酒磨厚角約一下利渴引飲無度麥門冬去心三兩烏梅肉二十箇

錢許溫熱調下不過二服便下熊氏補遺下利渴引飲無度麥門冬去心三兩烏梅肉二十箇

細到以水一升煮取七合細細呷之必效金



石礬 春門及六兩人參四兩甘銀二兩高末蜜丸  
男女血虛 春門又三斤取汁熬成膏生地黃三斤取汁熬成膏每分一處  
過入蜜四之一再熬成瓶收每日白湯點服忌諸器 醫方摘要

萱草

春門及六兩人參四兩甘銀二兩高末蜜丸  
男女血虛 春門又三斤取汁熬成膏生地黃三斤取汁熬成膏每分一處  
過入蜜四之一再熬成瓶收每日白湯點服忌諸器 醫方摘要

是則贈之丹練一名忘憂故也其治忘憂氣味如葱而麗食九種解毒之草其第一故又名忘憂  
生男故名宜男李九華延壽書云嫩苗為蔬食之動風令人昏然如醉因名忘憂此亦一說也  
綱目言萱草忘憂亦謂食之也鄭雅通志云乃謂萱草忘憂處田野有之俗名忘憂五月採花八月採根今人多採其嫩苗及花附作蔬  
言萱草一名合歡者誤矣合歡見木部

花六出四垂朝開暮落至秋亦不凋其花有紅黃紫三色結實三角內有子大如梧子黑而光澤其根與春門及根相似最易繁行南方草  
木狀言廣中一種水葱狀如康波草或紫或黃亦此類也或言鹿葵花有斑文與萱花不同時有謬也肥土所生則花厚色深有斑  
文起重臺間有數日屏上所生則花薄而色淡開亦不久枯合宜男花序亦云荆  
楚之士號為忘憂可以廣頌尤可為據今東人採其花附乾而食之名為黃忘憂

苗花氣味甘涼無毒主治飲食不化赤白痢疾除酒毒消食利濕熱作煩利胸膈安五臟令人好歡樂無憂輕身明目

根 治沙淋下水氣酒濕遺精通身骨痛汁服藏大熱血研汁一大盃和生薑汁半盃細呷之  
時發明 春門及六兩人參四兩甘銀二兩高末蜜丸  
男女血虛 春門又三斤取汁熬成膏生地黃三斤取汁熬成膏每分一處  
過入蜜四之一再熬成瓶收每日白湯點服忌諸器 醫方摘要

附方 新通身水腫 鹿慈根葉頭乾為末每服二錢入沸  
下壓半錢食前米飲服 聖惠方 小便不通 萱草根煎水頓  
杏林摘要 大便後血 萱草根

油炒酒服 食丹藥毒 聖林摘要

聖林摘要

聖林摘要

聖林摘要

聖林摘要

聖林摘要







苗氣味其滑無毒為百藥毒心傷人

別錄在景曰葵葉尤治利不可多食謂曰作菜茹甚甘美但性滑利不益人說曰其性雖冷若熱食之令人熱悶動風氣四月食之發宿疾天行病後食之令人失明謂葵生食動五種

留飲吐水凡服百藥忌食其心有毒也黃芩葵葉者勿食之不可合鯉魚食米酢食

害人時珍曰凡被狂犬咬者永不可食食之即發食葵須用蒜無蒜勿食之又伏硫黃

妊婦食之胎滑易生

蘇頌煮汁服利小腸治時行黃病乾葉為末及燒灰服治金瘡出血除客熱治惡瘡散膿血女人帶下小兒熱毒下

痢丹毒並宜食之

汪頌服丹石宜食葵酒燥利竅功與子同上發明時珍曰按唐王壽外臺秘要云天行斑瘡須臾偏身皆戴自製此藥

毒氣也高宗永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮葵葉葉以蒜薑啖之則止又聖惠方亦云小兒發斑用生葵葉葉絞汁少少與服

散惡毒氣按此即今痘瘡也今之治者惟恐其大小二便頻數洩其元氣痘不起發葵葉消數能利二便似不相宜而昔人賴之豈古今

運氣不同故治法亦隨時變易與附方舊四新三天行斑瘡上肉錐怪疾有人手足忽長倒生肉刺如錐痛不可諸瘡不合

火烘暖貼之不過二三百引膿盡即肉生也忌諸湯火傷瘡葵葉為末傳之蛇蝎螫傷葵葉搗汁服葵葉搗汁冷丹石發動口乾欬嗽者每食後飲冬月

魚鱗房事必效方湯火傷瘡食物本草蛇蝎螫傷之千金方誤吞銅錢飲葵葉汁一盞便臥少時食瘡

草本根氣味甘寒無毒治惡瘡療淋利小便解毒椒毒小兒吞錢不啗汁飲之甚妙甄權治瘡瘡出黃汁孟利竅滑胎止消渴散惡毒

氣附方舊五新七二便不通眼急者生葵根二斤搗汁三合生薑四兩取汁一合和勻分二服連用即通也消渴引飲小便不利葵根五兩水三大盞煮

斤水五斗煮三十每日漏胎下血血盡子死葵根並燒灰酒服方寸七日三千金方瘰癧瘰癧肉中忽生一點子大如豆或如梅李或赤或黑或白或青其膿

折其數毒姚和子乳雞葵及子為末酒服身面瘡瘡出黃汁者葵根燒灰和葵根燒灰酥調口增坦集驗方妬乳雞瘰癧寸七日二皆瘰癧瘰癧食瘰癧本草小兒耳瘡葵根燒灰酥調口



卷二

黃芩為之使

弘景  
通大便消水氣

云乳婦氣脉  
無滋氣脉通

飲死者時後  
水四升煮

後林歷

金葵子一合  
獨破水二升

方 胞衣

孟詵曰三日後取藥

劉叔壽 子黃

141322

也夏小正

人家植之春



初種子及月宿根亦自生苗時亦可茹食葉似葵菜而大亦似綠灰葉有歧又遇小滿後長莖高五六尺花似木槿而大有深紅淺紅紫黑白色單葉千葉之莖著人謂其莖葉密著單葉莖花金粉檀心者頗善狀之惟紅白二色入藥其實大如指頭皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及莖葉仁輕虛易種宜種皮可縐布作繩一種小者名錦葵即刺葵也備雅謂之敗音喬其花大如五錢錢粉紅色有紫縷之章為錫補注本草謂此即戎葵非矣其功用亦相似

**苗氣味甘微寒滑無毒**  
意趣曰不可久食饒人志性若被狗傷者食之永不瘡也李廷飛曰合猪肉食人無願也  
**主治除客熱利腸胃**  
思慮食治丹石發熱大人小兒熱毒下痢

**作蔬食滑竅治淋潤燥易產**  
珍揭爛塗火瘡燒研傅金瘡明

**根莖至滑氣利小便散腫無毒**  
藏明宗典曰蜀葵四時紅色單葉者根附方新  
**小便淋痛**  
葵花根洗剉水煎五七沸服之如神 衛生寶鑑  
**小便血**

**淋花根二錢車前十一錢**  
葵莖無灰酒服方  
**小便尿血**  
葵莖無灰酒服方  
**小便尿血**  
葵莖無灰酒服方

**子大母心米飲下二十八時腹血**  
不可忍者及花根去黃皮搗爛  
**小兒疳瘡**  
經年欲腐及根燒研傅之 聖惠方  
**小兒口瘡**  
亦葵莖炙乾為末

**吳葵花**  
花甘冷無毒  
**主治理心氣不足**  
小兒風癇瘡瘡  
**治帶下目赤火和血潤燥通竅利大小腸**

**明張元素曰蜀葵花陰中之陽也亦善治赤帶白帶**  
白帶赤帶治血瘕  
**附方**  
**新五二便關格**  
張問欲死二三日則殺人蜀葵花一兩搗

**瘰癧邪熱**  
蜀葵花白者陰乾為末服之午日取  
**婦人帶**  
胎腹冷痛面色虛黃日漸虛困用葵花一兩陰乾為末每

**酒釀赤鼻**  
蜀葵花研末臘猪膽和  
**吞錢錢**  
葵花葉汁服  
**五月五日午時收蜀葵花石榴花文心**

**子氣味甘冷無毒**  
**治濕通小腸催生落胎癰水腫治一切瘡疥并癰疽赤腫**  
明珍曰按楊士瀛直指方云蜀葵子炒入宣







不下即上方用癰疽腫毒黃蜀葵花用鹽炒收斂器中密封經年不壞每小兒口瘡黃蜀葵花燒末傅小兒木舌黃蜀葵花為末一錢黃

火灼傷用瓶盛麻油以筋就樹尖取黃蜀葵花收入瓶內勿犯小兒疳瘡黃蜀葵花大黃黃芩等分為末

子及根氣味甘滑無毒治癰腫利小便五淋水腫產難通乳時珍曰冬葵黃蜀葵花形狀雖各不同而性俱寒滑故

生及利小便要藥或用或入湯散皆宜其性滑與冬葵子同附方舊二臨產催生常與冬葵子同用時珍曰黃蜀花子古方少用今為確

功故也花子與根性功相同可以互用無花用子無子用根附方新二臨產催生經驗方用子焙研三錢并華水服無子用根煎

汁便癰初起淮人用黃蜀葵子七七粒皂角半搗為癰腫不破黃蜀子研酒服一粒則一打撲傷損黃蜀子研酒服

服便癰初起末以石灰同醋調塗之永類鈴方癰腫不破黃蜀子研酒服一粒則一打撲傷損黃蜀子研酒服

龍葵唐本草校正并人圖經藥名苦菜唐本天茄子綱目天泡草綱目老鴉酸漿草綱目老鴉眼睛草綱目老鴉眼睛草

形名天泡老鴉眼睛皆以子形名也與酸漿相類故加老鴉以別集解非奈也龍葵所在有之關河間謂之苦菜華圖花白子若牛李子

之五爪龍亦名老鴉眼睛草敗醬苦菜並名苦菜名同物異也集解非奈也龍葵所在有之關河間謂之苦菜華圖花白子若牛李子

生青熟黑但堪養食不任生噉頃曰龍葵近處亦稀惟北方有之人謂之苦菜華圖似排風而無毛花白色子亦似排風子生青熟黑其

亦者名亦珠亦可入藥又曰老鴉眼睛草生江湖間葉如茄子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經草部人亦不

能法識之時珍曰龍葵龍珠一類二種也皆處處有之四月生苗嫩時可食柔滑漸高二三尺莖大如筋似燈籠草而無毛葉似茹葉而

小五月以後開小白花五出黃蕊結子正圓大如五味子上有小蒂數顆同綴其味酸中有細子亦如茄子之子但生青熟黑者為龍葵

草部



少睡龍葵菜同米煮作羹  
粥食之 食醫心鏡

莖葉根氣味同主治搗爛和土傅丁腫火丹瘡良  
孟治癰疽腫毒跌撲傷損消腫散血時珍根與木通胡荽煎湯服通利便

舊四新八通利小便方見從高壓欲死者取老鴉眼晴草莖葉搗汁  
服以渣傳患處 唐珙經驗方火灼丹腫老鴉眼晴草葉入醋細研傅之  
能消赤腫 蘇頌圖經本草癰腫無頭龍葵莖葉搗  
傅 經驗方

癰疽成瘡者蘇頌圖經云用龍葵一兩為末齋香一分研勻塗之甚善 袖珍方云一切  
發背癰疽瘰癧用蝦蟆一個同老鴉眼晴草莖葉搗爛傅之即散其效驗如神也諸瘡惡腫老鴉眼晴草搗酒服  
以渣傳之 普濟方腫毒瘡色

揪腫者乃服丹石毒也赤色者肉腐毒也用龍葵根一握洗切乳香末黃連三兩杏仁六十枚和搗作餅厚如三錢依瘡大小傅之瘡底  
即換去座不可忌切勿搔動俟火瘡中似石榴子數粒乃去華時時以甘草湯溫洗洗後以蠟貼之終身不得食羊血如無龍葵以  
蔓菁根代之 聖濟總錄

聖濟總錄 天泡濕瘡龍葵莖葉  
搗敷之吐血不止天茄子苗半兩人參二錢半為末  
每服二錢新汲水下 聖濟總錄除蚤虱天茄子鋪於席  
下次日盡死多年惡瘡天茄子貼之或為  
末貼 救急良方

後腸出不收老鴉酸漿草一把水煎  
先重後洗收乃止 救急方

子七月主消腫唐明目輕身甚良甄權治風益男子元氣婦人敗血蘇頌

龍珠拾遺珠頌曰龍葵子赤者  
遺珠名赤珠象形也集解甄權曰龍葵赤珠者名龍珠按去汁可食能變白令黑藏器曰龍珠生道旁子圓似龍葵  
但熟時正赤耳時珍曰龍珠龍葵雖以子之黑赤分別其實一物二色強分為二者也

苗氣味葉無毒主治龍葵白髮令人不睡主諸熱毒石瘰癧動調中解煩  
蘇頌曰龍珠服之變白令黑耐老若能生食得苦者  
不食他藥十日後即有靈異也不與葱蒜同噉根

亦入藥用

子氣味同主消腫藏器



酸漿

本經中品

酸漿部苦酸漿部酸漿

酸漿部苦酸漿部酸漿

酸漿部苦酸漿部酸漿

酸漿部苦酸漿部酸漿

酸漿部苦酸漿部酸漿

酸漿部苦酸漿部酸漿

酸漿部苦酸漿部酸漿

酸漿部苦酸漿部酸漿

酸漿部苦酸漿部酸漿

酸漿部苦酸漿部酸漿

酸漿部苦酸漿部酸漿

雅苦酸漿也郭璞注云即今酸漿江東人呼為苦歲小者為苦歲亦呼為小苦酸漿約古今注云歲一名歲子實形如皮弁其子圓如珠時珍曰酸漿以子之味名也苦歲苦酸以苗之味名也燈籠及弁以魚之形名也王母洛神珠以子之形名也按楊慎庭言云本草燈籠草苦酸漿皆一物也傳本草者非一時一人故重複耳燕京野果名紅姑爆外垂絲囊中含赤子如珠酸甘可食盈盈遠御與翠草同芳亦自可愛益姑爆乃瓜囊之訛古者瓜姑同音爆囊之音亦相近耳此說得之故今以本經酸漿唐本草燈籠草嘉祐本草苦酸俱并為一馬

集解如梅李大皆黃赤色小兒食之保胃曰酸漿即苦歲也根如蘋萍白色極苦高錫曰苦酸生故墟垣整間高二三尺子作角

如撮口袋中有子如珠熟則赤名關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草一種小者名苦酸備推謂之黃酸恭曰燈籠草所在有之枝幹高三四尺有紅花狀若燈籠內有紅子可愛根莖實並入藥用宗典曰酸漿即苦酸也嘉祐重出苦酸條天下有之苗如天茄

子開小白花結青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中復有細子如落蘇之子食之有青草氣也時珍曰龍葵酸漿一類二種也酸漿苦酸一種二物也但大者為酸漿小者為苦酸以此為別敗醬亦名苦酸與此不同其龍葵酸漿苗葉一樣但龍葵莖光無毛五月入

秋開小白花五出黃蓋結子無殼葉數顆同枝子有蒂蓋生青熟紫黑其酸漿同時開小花黃白色紫心白蓋其花如盃狀無瓣但有五共結一鈴殼凡五稜一枝一顆下懸如燈籠之狀殼中一子狀如龍葵子生青熟亦以此分別便自明白按庚辛王冊云燈籠草四方

皆有惟川陝者最大葉似龍葵嫩時可食四五月開花結實有四葉感之如燈籠河北呼為酸漿據此及楊慎之說則燈籠酸漿之為一物尤可證矣唐慎微以三葉酸漿附於酸漿之後蓋不知其名同物異也其草見草之八酢漿下

苗葉莖根氣味苦酸無毒高錫曰有小毒恭曰苦大寒無毒時珍曰主治酸漿治熱煩渴定志益氣利水道本經搗汁服治黃病

多效景燈籠草治上氣欬嗽風熱明目根莖花實皆苦本苦酸草治傳尸伏連鬼氣疳疔邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱

欬嗽多睡勞之嘔逆痰壅瘰癧瘡滿小兒無辜癰子寒熱大腹殺虫落胎去蠱毒並煮汁飲亦生搗汁服研膏傳小兒內癖

龍草若能除濕熱輕能治上焦故主熱欬咽痛此草治熱痰欬嗽佛耳草治寒痰欬嗽也與片苓清金丸同用更效附方新熱欬咽痛

時珍曰酸漿利濕除熱故清肺治咳利濕故能化痰治疽一人病虛乏咳嗽有痰惡以此加入湯中用之效如神

草部

草部

草部



草為末白湯服名清心丸仍候瘡作痛烙籠草炒焦研末酒以醋調傳候外丹漆瘡要口瘡作痛調呷之醫學正傳發瘡不發貼之

子氣味酸平無毒

別錄

主治熱煩定志無氣利水道產難吞之立產

別錄食之除熱治黃病尤益小兒

蘇頌治骨蒸熱戶疰疳瘦癪瘵熱

結與茵莖同功

新發

酸漿實丸

治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難產用酸漿實五兩莖實三兩馬蘭子炒大鹽榆白皮炒二兩

聖濟總錄

瘡天泡草鈴兒生搗敷之亦可為末油調敷鄧才雜興方

蜀羊泉

本經

別錄

漆姑草

時珍曰諸名草解能治漆瘡故曰漆姑

集解

別錄曰蜀羊泉生蜀郡山谷景曰方不復用人無識者謂此草俗名漆姑實似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有移所

在平澤有之生陰濕地三月四月採苗葉陰乾藏器曰陶注杉材云漆姑葉細多生石邊能療漆瘡蘇云漆姑是羊泉按羊泉乃大草漆姑草如鼠跡大生階墻間陰處氣辛烈投付漆瘡亦主漆毒乃同名也頌曰或言老鴉眼睛草即漆姑草漆姑乃蜀羊泉人不能決識

時珍曰漆姑有二種蘇恭所說是羊泉陶陳所說是小草蘇頌所說老鴉眼睛草乃龍葵也又黃蜂作窠即漆姑草汁為蒂即此草也

氣味苦微寒無毒

主治瘡惡瘡氣疥癩癰疽

本經療齒齒女子

陰內傷皮間實積

別錄

小兒驚毛髮

髮搗塗漆瘡

時珍出

附方

一黃痘疾

漆草一把搗汁和酒服不過三五次即愈

鹿蹄草

綱目

秦王試劍草

時珍曰鹿蹄草葉形能合金瘡故名試劍草又山慈姑亦名鹿蹄與此不同

集解時珍曰按軒轅述寶藏論云鹿蹄多生江廣平陸及寺院荒處淮北絕少川陝亦有苗似莖菜

佳

時珍曰按軒轅述寶藏論云鹿蹄多生江廣平

而葉頗大背紫色春生紫花結青實如天茄子可制雖黃丹砂氣味

缺

主治金瘡出血搗塗即止又塗一切蛇虫犬咬毒

時珍

敗醬

本經

綱目

澤敗

別錄

鹿腸

別錄

馬草

別錄

景曰根作陳敗豆醬氣故以為名時珍曰南人採嫩者暴蒸作菜食

苗形則集解別錄曰敗醬生江夏川谷八月采根暴乾弘景曰出近道葉似棉發根形如紫胡恭曰此藥不出近道多生園隙間葉似水不同也集解敗人微黃生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似棉發也頌曰江東亦有之狀如蘇恭所說時珍曰處處原野有之俗名苦



菜野人食之江東人每家收儲為春初生苗深冬始凋初時葉布地生似松葉蕈而根長有錫齒綠色而深黃後長秋葉高二三尺而葉弱數寸一節節間生葉四散如嫩頭頂間白花成簇如片花蛇狀子花狀結小實成簇其根白紫頗似紫胡荽普言其根似蛇根言其根似蛇每根者皆不誤

**根**  
同治  
凡收得便粗杆人甘草葉相并  
對蒸從已至未去甘草葉焙乾用  
**氣味**苦平無毒  
別錄曰鹹微寒權曰辛苦微寒  
天明曰酸時珍曰微苦帶甘  
**主治**暴熱大瘡赤氣疥癩瘡痔馬鞍熱

**氣**  
本經  
除癰腫浮腫結熱風痺不足產後諸病  
錄治風癰瘰癧多年凝血能化膿為水產後諸病止腹痛除疹煩渴  
權治血氣心腹痛破癥

**結**  
催生落胞血暈鼻衄吐血赤白帶下赤眼障膜內障耳癢癰疥癬丹毒排膿補瘻  
大時珍曰敗醬乃手足陽明厥陰藥也善排膿破血故仲景治癰及古方婦人科皆用

**之**  
乃易得之物而後人附方舊  
**三**  
腹癰有膿  
養滋仁附子敗醬湯用養滋仁十分附子二分敗醬五分搗為末每

**六**  
分續斷藥各八分為常打如各四分生地黃  
**產**  
後腰痛  
乃血氣流水腰腿痛不可轉者敗醬當歸各八分皆藥

**草**  
五兩水四升煮二升每服二  
**合**  
日三服良  
衛生易簡方  
**蠅**  
蟻康瘡  
連腰者敗醬煎汁塗之良楊氏產乳

**迎春花**  
目集  
時珍曰處處人家栽種之者生高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無  
苗面青背淡對節生小枝一枝三葉正月月初開小花狀如瑞香花黃色不結實

**葉**  
氣味苦澀無毒  
**治**  
腫毒瘰癧乾研末酒服三錢出汗便瘥  
衛生易簡方

**欵冬花**  
本經  
品釋名欵冬  
郭璞云欵冬  
**中**  
品釋名欵冬  
郭璞云欵冬  
**藥**  
性味苦平無毒  
**治**  
腫毒瘰癧乾研末酒服三錢出汗便瘥  
衛生易簡方

**也**  
至冬而花也常與百草中惟此不韻水雪最先春也故世謂之欵冬  
藥性論在水雪之下至時亦生  
**藥**  
性味苦平無毒  
**治**  
腫毒瘰癧乾研末酒服三錢出汗便瘥  
衛生易簡方

**本草綱目**  
**卷十六**  
**草部**  
**十一**



參長月母年庚寅黃氏等合重刊  
 主治 嗽逆上氣善喘喉痺諸患癰寒熱邪氣  
 經 消渴喘急呼吸艱難肺氣促急熱勞欬連連

雞子許多蜜拌花使潤紅一升鐵罐中又用一瓦器鑽一孔孔內安一小筆管以鶴尾泥封勿令漏氣鑊下着炭火少時烟從筒出口令吸之如胸中少悶須舉頭即將指頭按住筒口勿使漏至煙盡乃止如是五日一為之待至六日飽食羊頭燒此一頭永無瘰癧自

淋子煎湯漱口乃以餅子傳之少頃  
確住其瘡立消也 楊誠經驗方

耳又有白毛蒙耳之故北人呼爲茸母佛耳則鼠耳之說也今淮人呼爲毛耳朵則香茅之葉以當作毛接段成式嶺云蚍蜉草鼠耳也一名無心草蓋蚍蜉食比較有是名者耶

採薺和米粉搗作粿果食時珍曰中華草鼠糲即別錄鼠耳也唐家諸家不知乃退鼠耳人有名未用中李果銀鋸法象用佛耳草亦不知其即鼠耳也原野間蔓二月生園薺柔嫩結莢長寸許白如鼠耳之毛開小黃花成穗畝田中蔓入果樹間蔓上



母故邵桂子嬰大語云北方寒食象耳母草氣味甘平無毒別錄曰鼠耳酸無毒宋曰佛耳草酸性和粉食宋徽宗詩其母初生認其母者是也熟飲之花為之使宜少食之過則損目主治鼠耳主痺寒寒熱止欬別錄

調中益氣止洩除痰壓時氣去氣嗽雜米粉作糧食甜美日華佛耳治寒嗽及痰降肺中寒大升肺氣李時珍曰治寒痰嗽宜用佛耳

日別錄云治寒熱止欬東垣云治寒嗽言其標也日華云治熱嗽言其本也大抵寒嗽多是火鬱於內而寒覆於外也按陳氏經驗方云三奇散治一切嗽嗽不問久近晝夜無時用佛耳草五十文款冬花二百文熟地黃二兩焙研末每用二錢於爐中燒之以筒吹烟嚥下

有涎吐去手家一獲又病此醫治不效偶在沅州得一婢用此法兩服而愈也

# 決明

本經釋名時珍曰此馬蹄決明也以明目之功而名又有草決明石決明傳解別錄曰決明子生龍門川澤十月十日採陰乾百日公景上品釋名決明皆同功者草決明即青箱子陶氏所謂蔓蒿是也

為馬蹄決明用之當搗碎又別有草決明是蔓蒿草在下品中頌曰今處處人家園圃所時夏初生苗高二四尺許根帶紫色葉似首蒼而大七月間黃花結角其子如青綠豆而銳十月採之按爾雅解者決光郭璞釋云藥草決明也華蓋銳亦華蓋如山葵更或曰後也關西謂之解者言其說與此種頗不類又有一種馬蹄決明葉如江豆子形似馬蹄葉更曰決明苗高二四尺許根帶紫色葉似首蒼子生角中如羊臂今湖南湖北人家所種甚多或在郊野成段獨本圖經言葉似首蒼而潤大者甚為允當時珍曰決明有二種一種馬蹄

決明莖高三四尺葉大於首蒼而本小未全書開夜合兩兩相帖林間淡黃花五出結角如初生細紅豆長五六寸角中子數十粒發差相連狀如馬蹄青綠色入眼目藥最良一種莖生決明救荒本草所謂山扁豆是也苗莖似馬蹄決明但葉之本小末全正似槐葉夜亦不合秋開淡黃花五出結角大如小指長二寸許角中子成數列狀如黃葵子而扁其色褐味甘滑二種苗葉皆可作酒釀飲呼為獨占缸但芒嫩苗及花與角子皆可瀉茹及點茶食而馬蹄決明苗皆苦不可食也蘇頌言解治即決明殊不類恐別一物也

子氣味鹽無毒別錄曰苦甘微寒之才曰主治青盲目淫膚赤白膜眼赤淚安服藉光輕身本經療唇口青別錄助肝氣益精以水

調末塗腫毒燭太陽穴治頭痛又貼胸心止鼻洪枕治頭風明目甚於黑豆日華治肝熱風眼赤淚每旦取一匙按淨空心吞之百日後

夜見物光數權益壽解蛇毒震葉作菜食利五臟明目甚良時珍曰相感志言圖中種決明蛇不敢入丹溪朱氏言決明解蛇毒

夜見物光數權益壽解蛇毒震葉作菜食利五臟明目甚良時珍曰相感志言圖中種決明蛇不敢入丹溪朱氏言決明解蛇毒

夜見物光數權益壽解蛇毒震葉作菜食利五臟明目甚良時珍曰相感志言圖中種決明蛇不敢入丹溪朱氏言決明解蛇毒

夜見物光數權益壽解蛇毒震葉作菜食利五臟明目甚良時珍曰相感志言圖中種決明蛇不敢入丹溪朱氏言決明解蛇毒







去皮膚中熱氣使人潤澤散惡瘡疔癰強陰

別錄  
治陰疽癰疾主熱風疔作瀉沐浴與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣勞  
權治客熱丹腫日食月戒器曰氣病皆起于虛虛  
華有日而多熱者加地膚子甘草附方

舊三風熱赤白  
地膚子焙一升生地黃半斤取汁和作餅  
晒乾研末每服三錢空心酒服  
聖惠方  
目痛眯目  
凡目痛及眯目中傷有熱瞖者取地膚  
子白汁頻注目中  
玉靈外臺秘要  
雷頭風腫  
不省人事落常子  
同生薑研爛熱沖

酒服取汁卽下  
愈聖藥絕錄  
方寸七壽域神方  
疔氣危急  
地膚子卽落帚子炒香研末  
每服一錢酒下  
簡便方  
狐疝陰癰  
地膚子五錢白木二錢半桂心五分爲

生葱桃李必效方  
治瘰癧瘰癧  
乾末酒服方寸七日五六服  
肘後血痢不止  
地膚子五兩地榆黃芩各一兩為末  
每服方寸七溫水調下  
聖惠方女患淋  
手足煩疼  
熱痛酸楚

地膚子十二兩水四升煎取二升半分服  
子母秘錄月丹湯頻洗毒域神方

苗葉氣味藁無毒  
石粉霜水銀硫黃雄黃礞石  
主赤白痢燒灰亦善煎水洗目去翳障宜溫痛別錄  
主大腸瀉和

氣滯腸胃 飲食不進 煎水日服 治手足煩疼 小便諸淋 其效如神 此方得自一老方 取地膚草搗自然汁服之 遂通至賤之物有回生之

能益陰氣通小腸無陰則陽無以化亦求垣治小便不通用黃蘗知母滋腎之意

方

音曰華本草云一名燕麥一名江建草者又謂之山穀立火采食上藥也今出近道一莖生烟葉紅紫赤色可

矣燕麥即雀麥雀麥二字相近傳爲之訛爾集韻愛合子葉刈取之子頗似麥子有兩種一種微大花邊有入極末知何者是也今市人

本草綱目 卷十六 草部



皆用小者後一種葉莖相似而有毛花晚而其赤按經云採實其中子細燥熱便脫蓋矣頭曰今處處有之苗高一尺以葉葉共小青色根莖黑色形如細蔓青花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月間開七月結實作穗子頗似麥河陽河中府出者苗可用淮南出者根細村民取作劇帚爾雅謂之天菊廣雅謂之武葵是也時珍曰石竹葉似地膚葉而小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺餘稍間開花田野生者花大如錢紅紫色人家栽者花稍小而嫵媚有細白粉紅紫亦斑斕數色俗呼燕洛陽花結實如燕麥內有小黑子其嫩苗焯熟水淘過可食

**穗脩治**

穀曰凡使口用蓋穀不用蓋若一時同使即空心令人氣噎小便不禁也用時以華竹根浸一伏時流腫

**氣味**

藥性論曰苦微甘才曰畏草壯丹為之使惡蟬蛻伏丹砂

**主治**

通出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮別錄曰五淋月經不通破血塊排膿大

**葉主**治痔瘻并瀉痢湯粥食又治小兒蛔虫及丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治漆瘡并婦人陰瘡明發明發明發明發

頤曰古今方通心經利小腸為最要藥頤曰八正散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣蓋小腸與心為傳送故用此入小腸本草並不治心熱若心無大熱止治其心或制之不盡當求其屬以衰之可也時珍曰近古方家治產難有石竹花湯治九孔出血附方舊六新五小便石淋宜破血瞿麥子搗為末酒服方寸匕

有南天竺飲皆取其破血利氣也附方新五小便石淋宜破血瞿麥子搗為末酒服方寸匕外臺秘要小便不利有水氣枯槁瞿麥丸王之瞿麥簡從岑山芋各三兩為末蜜和丸梧子大一服三丸日三末下焦結熱小便淋瀝或有血出或大小便出血瞿麥總一兩甘草炙七錢五知益至七八丸以小便利腹中溫為知也張仲景金匱方分山危子仁炒半兩為末每服七錢連錢越頭七個燈心五十莖生薑五片水二盞煎至七分時

服聖時溫服名立效散千金方子死腹中或產經數日不下以瞿麥煮濃汁服之千金方九竅出血服藥不止者南天竺草即瞿麥母指大一把山危子仁三

服聖濟總錄目赤腫痛浸淫等瘡瞿麥妙黃為末以驚涎調塗皆頭即開或搗汁塗之普濟方瞿麥生翳其物不出者生膚翳者瞿麥乾薑炮為末并華水調服二錢日二服聖惠方魚肝瘡瞿麥燒灰和油傅之

咽嚥骨哽瞿麥為末水服一升竹木入肉瞿麥為末水服方寸匕或煮汁日飲三次梅師方箭力在肉及咽喉胸膈諸隱處不出酒服瞿麥末方寸匕日三服千金方



王不留行

別錄上品雜草花

日金銀臺

時珍曰此物性走而不住有王命而不能留

集解曰王不留行生太山

處有之葉似酸漿子似松子人言是夢子不爾多人難獲方用保昇曰所在有一葉似松葉其花紅白色子殼似酸漿其中實圓黑似松

子大如黍粟三月收苗五月收子根苗花子並通用頌曰今江浙及並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸已采根黃色如薔根紫興如

小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫莖隨莖而生如松子狀又似諸藍花五月採苗莖曬乾用俗謂之剪金草河北生者葉圓花紅與

此小別時珍曰多生麥地中苗高者一二尺三四月開小花如鐮鈴狀紅白色結實如燈籠莖子較有五六枚殼內包一實大如豆實內細

子大如松子生白熟黑正圓如細珠可愛陶氏言葉以酸漿葉氏言花如

松子狀者皆欠這審以子為花葉狀也燈籠草即酸漿也苗子皆入藥

苗子

價

數曰凡採得拌濕蒸之從已

氣味苦平無毒

晉曰神農本草平岐伯雷公甘

素曰甘苦平陽中之陰

主治金瘡止血逐痛出刺除風痺內塞止心

煩鼻衄癰疽惡瘡癰乳婦人難產久服輕身耐老增壽

別治風毒通血脈

甄權遊風風癰婦人血經不勻發背

日下乳汁

素利小便出竹木

刺時

月元素曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

時珍曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

時珍曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

時珍曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

時珍曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

時珍曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

時珍曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

時珍曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

時珍曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

時珍曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

時珍曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也

剪金花

日金銀臺

時珍曰此物性走而不住有王命而不能留

集解曰王不留行生太山

處有之葉似酸漿子似松子人言是夢子不爾多人難獲方用保昇曰所在有一葉似松葉其花紅白色子殼似酸漿其中實圓黑似松

子大如黍粟三月收苗五月收子根苗花子並通用頌曰今江浙及並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸已采根黃色如薔根紫興如

小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫莖隨莖而生如松子狀又似諸藍花五月採苗莖曬乾用俗謂之剪金草河北生者葉圓花紅與

此小別時珍曰多生麥地中苗高者一二尺三四月開小花如鐮鈴狀紅白色結實如燈籠莖子較有五六枚殼內包一實大如豆實內細

子大如松子生白熟黑正圓如細珠可愛陶氏言葉以酸漿葉氏言花如

松子狀者皆欠這審以子為花葉狀也燈籠草即酸漿也苗子皆入藥

子大如松子生白熟黑正圓如細珠可愛陶氏言葉以酸漿葉氏言花如

松子狀者皆欠這審以子為花葉狀也燈籠草即酸漿也苗子皆入藥

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服

聖濟總錄

金瘡

王不留行散治身破刀各傷亡血用王不留行十分八月八日採之胡蘿蔔細葉十

分七月七日採之桑葉向根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩

濃煎汁溫服之

王不留行末水服





王不留行子熟米麴餅丸黍米六每

一丸酒下汁飲之

時珍曰剪春羅一月生莖高尺餘葉綫形對生抱莖入夏開花淡紅色花大如錢凡六出唐崔玄參可受結實大如豆內有細子人家多種之為玩又有剪紅紗花莖高二尺葉旋覆夏秋開花狀如石竹

氣味甘無毒主治火帶瘡速腰生者採花或蜂蠟燭蜜調塗之為末亦可  
時珍出產  
治要訣

雞頭實其中變生一小虫脫而能行中夏採花

周憲王曰金龜焚香譜高四寸葉似初生薄葉厚而抱莖而生莖子脆莖頭屈花大如指頭金黃色狀如菊四時不色葉味酸煖水浸過油鹽拌食時珍曰夏月結實在萼內宛如尺蠖虫數枚蟠屈之狀故蘇氏言其化中蠶非虫也

城者最勝今近道亦有母即公養也子細黃至苦用之

當盤曰今汴東陝西河北州郡皆有之曹州者九佳初生葉長六七寸似薺根白色枝莖俱青三月間花微黃結子爲小如米粒微長黃色月令孟夏之月靡草死許慎鄭玄注皆云靡草葶藶等屬之屬是一說葶藶草莖向上葉端出莖短且短又有一種狗芥草

葉近根下作寄生角經長取時必須分別此二種也覆曰凡使芎藭子真相似口是味微甘苦葶藶子之苦入頂也蘇珍世投葶藶云葶藶也郭璞注云葶藶皆似芥一名狗薺然則狗芥即是葶藶矣葶藶有甜苦二種狗芥味微甘即甜葶藶也或云甜葶藶是

卷之四

頭瘡無氣入腦設人之才曰榆皮爲之使得酒良惡白殭蚕石龍芮

時珍曰主治癥瘕積聚結食飲食寒熱破堅逐邪通利水道本下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面浮腫身暴中熱癰瘍利小腸



卷之六

味

有不

以火

之有

要  
丸  
新

自丸  
小小

杏仁  
十服

其氣

日滿

卷二



瘡虫蝕齒

等瘡雖黃等分爲木臘月指脂和成以綿裹搜枝蠟點金屑要緊

聖惠方

瘰癧已潰

瘰癧二六散一升搗作餅子如錢大厚二分安瘡孔上又作疔灸之令溫熱不可破有數易之而灸但不可炙初起

之瘡惡毒瘡氣入

馬汗毒氣

入腹生瘡子一兩炒研水一升服傷人也永類方

車前

上品經云

車前子

本經云

車前子

車前子

車前子

車前子

車前子

車前子

車前子

車前子

道馬局牛遺之名爲足履也幽州人謂之牛舌履喜藏伏于下故江東稱爲蝦蟆衣又韓詩外傳言直曰車前覆曰北郊爲齊強說也重乃生於兩旁者

李食其實宜子孫者謂爲慈母今出開州者勝強曰今江湖間近汴北地處處有之春初生葉布地如匙面葉年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠尾花甚細實青白細亦結實如草葉亦果也今人五月採茹七月八月採實人家團團或種之蜀中尤尚北人取根日乾作藥花貴之甚誤所用陸機言嫩苗作如大滑今人不復識之韓詩曰

王曼山居錄有種車前實諸食法則昔人常以爲蔬菜今野人猶採食之

子膏治

時珍曰凡用須以水淘洗去泥沙晒乾入湯液炒過用丸散則以酒浸一夜蒸熟研爛作餅晒乾研

氣味甘寒無毒

大明曰常山爲之使

治氣癰止痛利水道小便除濕痺

久服輕身耐老

男子傷中女子淋瀝

不飲食養和強陰益精令人有子明目療赤痛

去風暴肝中風軟暴風衝眼赤痛障翳痛淚

出產丹石毒

心胸煩熱

治婦人難產

車前子

車前子

車前子

車前子

車前子

車前子

車前子

景丸用車前免絲二物蜜及食下服古今以爲奇方也好古曰車前子能利小便而不生痰與茯苓同功時珍曰按神仙服食經云車前一名地衣雷之精也服之形化八月採之今車前五月子已采而云七八月者地氣有不同爾唐張鷟詩云開州午月車前子作藥人皆

道有神術愧文君情病眼三千里外寄關人觀此亦以五月採開州者爲良又可見其治目之功大抵入服食須佐他藥如六味地黃丸之用澤瀉可也若單用則泄太過恐非久服之物政陽公常得養下病國醫不能治夫人買市人藥一帖進之而愈力叩其方則車前子

一味爲末米飲服二錢之云此藥利水道而滑方舊云不動氣水道利則清濁分而熱自止矣

附方五小便血淋



肘 老人淋病 身體軟弱 車前子五合 湯是黃汁入青 後方 米四合 煮粥 常服 明目 專親 奏效 孕婦 執林 車前子五兩 葵根切一升 以水五升 煎 滑胎 易產 車前子為末 酒服 方寸匕 不飲酒者

水調服 詩云 采采芣苢 能令婦人學有子也 橫痃 不出 車前子末 酒服二 陰冷 閉瘕 漸入 囊內 腫滿 殺人 車前子末 飲服 方寸匕 七日 二服 千金方 癰瘕 入腹 車前子末 陸機注云 治婦人產難 故也 婦人良方 錢子母秘錄 聖惠方 補虛明目 駐景丸 治肝腎俱虛 眼昏 黑花 或生障翳 迎風有淚 久服 補肝腎 增目力 車前子熟

粉之良 聖下 痒痛 車前子煮汁 頓 外臺秘要 久患 內障 車前子乾地黃 麥門冬等分 為末 蜜丸 補虛明目 迎風有淚 久服 補肝腎 增目力 車前子熟 千金方 聖下 痒痛 洗 外臺秘要 久患 內障 車前子乾地黃 麥門冬等分 為末 蜜丸 補虛明目 迎風有淚 久服 補肝腎 增目力 車前子熟

地黃酒 煮焙三兩 羌活 續斷 酒浸五兩 為末 煉蜜丸 風熱 目暗 痛 車前子 宣州黃連 各一兩 為末 梧子 大 每溫酒下 三十九日 二服 和劑局方 食後溫酒服 一錢 日二服 聖惠方

草及根 治 數日 凡使須一車 有九葉 內有莖 莖可長一尺二寸 者 和桑葉根 氣味甘寒 無毒 土宿 真君曰 可伏硫黃 主治 金瘡 止血 結草 砂伏 五寶 粉霜 弘景曰 其葉搗

鼻 瘡 血 瘡 下血 小便 赤 止 煩下 氣 除小 虫 別 王 陰 瘡 才 葉 主 泄 精 病 治 尿 血 能 補 五 臟 明 目 利 小 便 通 五 淋 甄 權 發 明 汁 服 瘡 瘕 泄 精 甚

驗 乘 輿 曰 陶 說 大 誤 矣 此 藥 甘 滑 利 小 便 泄 精 氣 有 人 作 菜 頻 食 小 便 不 禁 幾 為 所 誤 也 附 方 舊 四 新 七 小便 不通 車前草一斤 水三升 煎取一升 半分三服 初生 尿 澀 不通 車前 搗 汁 入 精 氣 有 人 作 菜 頻 食 小 便 不 禁 幾 為 所 誤 也 附 方 舊 四 新 七 小便 不通 車前草一斤 水三升 煎取一升 半分三服 初生 尿 澀 不通 車前 搗 汁 入

幼 心 小便 尿 血 車前 搗 汁 五 合 空 鼻 衄 不 止 生 車 前 葉 搗 汁 飲 金 瘡 血 出 車 前 葉 搗 傳 之 千 金 方 熱 痢 不 止 車 前 葉 搗 汁 入 蜜 一 產 後 血 滲 入 大 小 腸 車 前 繼 心 服 外 臺 秘 要 鼻 衄 不 止 生 車 前 葉 搗 汁 飲 金 瘡 血 出 車 前 葉 搗 傳 之 千 金 方 熱 痢 不 止 車 前 葉 搗 汁 入 蜜 一 產 後 血 滲 入 大 小 腸 車 前

草 汁 一 升 入 蜜 一 合 和 煎 濕 氣 腰 痛 蝦 蟌 草 連 根 七 科 葱 白 連 翹 七 料 藥 七 喉 痺 乳 蛾 蝦 蟌 草 鳳 尾 草 搗 爛 入 霜 梅 肉 煮 酒 各 少 許 再 研 一 沸 分 二 服 崔 氏 方 枚 煮 酒 一 瓶 常 服 終 身 不 發 簡 便 方 車 前 葉 搗 汁 入 蜜 一 產 後 血 滲 入 大 小 腸 車 前

漫 目 赤 作 痛 車 前 草 自 煎 汁 調 朴 消 未 臥 時 塗 眼 胞 上 次 早 洗 去 目 中 微 翳 車 前 葉 搗 汁 入 蜜 一 產 後 血 滲 入 大 小 腸 車 前 聖 目 赤 作 痛 小 兒 目 痛 車 前 草 汁 和 竹 瀝 點 之 聖 濟 總 錄 目 中 微 翳 車 前 葉 搗 汁 入 蜜 一 產 後 血 滲 入 大 小 腸 車 前

狗 舌 草 唐 本 集 解 曰 狗 古 生 巢 壘 濕 地 取 生 葉 似 車 前 而 無 氣 味 苦 寒 有 小 毒 主 治 瘡 疥 瘡 殺 小 蟲 為 末 和 塗 之 即 瘥 蘇 草 集 解 曰 狗 古 生 巢 壘 濕 地 取 生 葉 似 車 前 而 無 氣 味 苦 寒 有 小 毒 主 治 瘡 疥 瘡 殺 小 蟲 為 末 和 塗 之 即 瘥 蘇

馬 鞭 草 別 錄 正 并 八 圖 雞 籠 草 經 國 野 草 不 同 補 植 雞 籠 故 名 雞 籠 草 曰 此 說 未 近 乃 其 節 生 紫 花 如 馬 鞭 節 且 時 珍 曰 下 品 藥 龍 牙 草 雞 籠 草 經 國 野 草 不 同 補 植 雞 籠 故 名 雞 籠 草 曰 此 說 未 近 乃 其 節 生 紫 花 如 馬 鞭 節 且 時 珍 曰

本草綱目 卷十六 草部 十六



卷二

都不似蓮花也。俗名曰花白色。七月八月採苗。葉日乾用酒。白合。衡山廬山江准州郡皆有之。苗類益母草。葉似細辛。花紫色。微似蓮花。然葉似狼牙。及葉舒。約三四穗。花以專前穗類。類細辛。

身算生拖州高二尺以來春夏有榴葉至秋冬而枯採根洗淨用時曰馬鞭下地甚多春月生西方望  
間相葉作穗如東前穗其子如蓮莢子而細根白而小園含花似蓮葉狀色白鮮于冬間有誤矣

寒無毒謂升大明日平涼無毒白苦有毒伏丹砂硫黃主治部惡瘡癰疽血瘕久癰破血殺虫搗爛煎取汁飲如飴每空心酒服一

張月候不勻通月經  
附金瘡行血活血中  
厚搗塗癰腫及蠅蟻尿瘡男子陰腫  
珍附方  
新十疔瘰癧類  
五合酒二合  
馬鞭草切分

乾薑炮黃芩細切乾芎見火以酒或水同煮至味  
去滓溫服以六月中的雷鳴時採者有效衛生易簡方  
大腹水腫黃芩厚朴各十斤水一石煮取五斗去滓而  
煎今獨以粉和丸大豆大每服二三丸加至四五

婦人疝痛 名小腸氣馬鞭草一兩酒煎服婦人至月結成癰流脂脫大欲死者馬鞭草

馬粉並灰四錢白芷灰一錢並研凡  
魚肉癰疽馬瘦魚鱸汁飲一升即消  
千金方

一塊搗白癩風瘡馬瘦草為末每服一錢食前煎芥蕒湯  
易下日三服見效若太早聖惠方  
人疥馬疥馬鞭草不化燒焙搗自煎汁煮羹飲  
盡十日內愈神效黃岡集方  
赤白下痢

拔用發汗難痛不可忍龍牙豆揭汗飲湯梅忌瘡馬鞭草煎湯爲先洗泥氣到便即除風爛脚血馬鞭草二條

赤白痢初起燐羅末每米飲服錢七無所忌

[illegible]

治蛇瘡皆驗遂名曰蛇釘草也其葉似龍牙而小背平別錄曰蛇含出益州山合八月採生乾之景曰蛇釘處

又各處有之而種並生在上則生苗土堪宜月然皆不



花者頌曰出興州今近處亦有生石上或下濕地蜀中人家亦種之辟蛇一莖五葉或七葉有兩種八月採根陰乾日華子云葉俱用五月採之文曰紫背龍牙生蜀中春夏生葉採無時時珍曰此二種細葉者名蛇銜大葉者名龍銜龍銜亦入瘡膏用數日蛇銜只用葉曬乾勿犯火根並不用勿誤用有集共葉者號竟命草其味酸溫服令人吐血不止速服知時子解氣味苦微寒無毒龍目有毒頌曰紫背龍牙平寒無毒王治萬病寒熱邪氣除熱金瘡疔瘰癧瘡頭

癰瘰心腹邪氣腹痛濕痺胎利小兒治兒寒熱丹瘰癧止血協風蠱癰腫赤眼汁傳蛇虺蜂毒大紫背龍牙解一切蛇毒治咽

喉中痛含之便效蘇頌曰蛇銜治蛇咬今以草納蛇口中縱傷人亦不能有毒也種之亦令無蛇頌曰古今治丹毒瘡腫方通

冷則減是也時珍曰按葛洪抱朴子云蛇銜膏連已斷之指今收葛洪肘後方載蛇銜膏云治癰腫瘰癧瘡後積血耳目諸病牛頭馬瘡用蛇銜大苗附子芍藥大戟細辛獨活黃芩當歸莽草蜀椒各一兩雞白十四枚右為末以苦酒淹一宿以猪膏二斤七星火上煎沸

成膏收之每溫酒服一彈丸日再服病在外摩之傳之在耳綿裹塞之在附方舊一產後漏痢小龍牙根一握湯煎服之甚目點之若入龍銜藤一兩則名龍銜膏也所謂連斷指者不知即此膏否新效即蛇含是也斗門方金瘡出血

草搗傳之葉背草入生醫研傳二吳公錄驗身面惡癬蛇銜授傳之三次斷根直指方蛇蟻傷古今錄驗

# 女青

本經下品釋名女青別錄曰女青蛇銜根也生朱崖八月採陰乾紅景曰若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用者是草葉別是一物

女青根出荊州蔡曰此草即雀巢也生平澤葉以雞摩兩相對子似鵝形大如栗許故名雀巢根似白微莖葉並異其蛇銜都非其類又別錄云葉嫩時似雞摩園端大莖葉葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬里餘也雞摩葉似女青故亦名雀巢雞摩曰雞摩是白環藤雀巢是女青二物相似不能分別終非一物也雞摩曰雞摩以子言女青以根言蛇銜以苗言三者氣味功用大有不同諸註因其同名雀巢而疑為一物又因其各出州郡而復疑為二物本草明言女青是蛇銜根豈可以根苗異地而致疑如雞摩無苗所產不同亦將分為二物乎如赤箭徐長卿同名鬼督郵亦將合為一物耶時珍曰女青有二一是藤生乃雞摩所說似雞摩者一種草生則蛇銜根也蛇銜有大小二種葉細者蛇銜用苗莖葉大者為龍銜用根故王惠外臺秘要龍銜膏用龍銜根煎膏治癰腫金瘡者即此女青也陳藏器言女青雞摩不能分別張揖廣雅言女青是舊類指龍牙子青非此女青也別錄明說女青是蛇銜根一言可據諸家止因其生朱崖致疑非矣方土各有相傳不同耳況又不知有兩女青乎又羅浮山記云山有男青似女青此則不



知是草生  
藤生者也

根氣味辛有毒

權曰苦無毒  
蛇銜為使

主治蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥  
本方舊二  
新一人卒暴死

楊女青屑一錢安咽中以水或酒  
送下立活也 南岳魏大人肉得吐利

死

及大人小兒卒腹皮青黑亦不能喘息  
即卒穰瘧 止月上寅日楊女青末三角錄  
急用女青末納口中酒送下 子母秘錄名穰瘧 瘧感聚帳中大吉 肘後方

鼠尾草

別錄曰音吳  
下品藥名動音山陵翹

拾遺時珍曰鼠尾以總形命名爾雅云勤鼠尾也可以染皂故名

集解別錄曰鼠尾生  
葉七月採花陰乾紅景曰田野甚多人採作滋養是保昇昇所在下濕地有之惟熟中人  
採為藥葉如蒿莖端見生四五穗穗若車前花有赤白種藏器曰紫花莖葉俱可染皂用

花葉氣味苦微寒無毒

主治風濕寒熱下痢膿血不止

花者主白下赤花者主赤下  
別錄主瘧疾水蠱  
時珍曰古方瘧  
疾多用之當濃  
煎令可丸服之或煎如飴服今人  
亦用作飲或末服亦得日三服  
附方舊一  
新三大腹水蠱  
方見馬  
鞭草下  
久痢休息  
時止時作鼠尾草花偽  
未飲服一錢 聖惠方  
下血連年  
鼠尾草地榆二兩水二升煮  
一升頓服二十年者不過再

服亦可為末飲  
服之千金方  
反花惡瘡  
內生惡肉如飯粒破之血出隨生反出于  
外鼠尾草根切同猪脂搗傅 聖濟總錄

狼把草

宋開

校正  
并入拾遺  
即耶草

釋名耶草

時珍曰此即陳藏器本草耶草也閩人呼為耶耶則狼把草  
作耶耶乃通又方士言此草即鼠尾草功用亦近之但無的據耳  
集解藏器曰狼把草生山  
道旁與穗秋子並可  
治人髮令人不老又云耶耶草主赤白痢小兒大腹瘧丹毒寒熱取根煮汁服  
藏器  
狼把草主丈夫血痢不瘳婦人根治積年瘧  
瘧取草三斤搗絞取汁一小升納白鵝半雞子許和勻空腹頓服極重者不過三服或收苗陰乾搗末蜜水半盃服二方寸匕  
經可染髮

染皇又曰耶耶草生山澤間高三四尺葉作雁蕩如鬼針苗兒針即鬼針也其葉有極如鉸脚狀禹錫曰狼把草出近  
道古方未見用者惟陳藏器言之而不詳文宗黃帝御書記其主療血痢甚為精至謹用書于本草圖經外類篇首  
氣味苦無毒

瘧取草三斤搗絞取汁一小升納白鵝半雞子許和勻空腹頓服極重者不過三服或收苗陰乾搗末蜜水半盃服二方寸匕  
經可染髮



髮治積年癬天陰即痒搔出黃水者搗末搽之時珍

狗尾草

綱目釋名音光明草綱目阿羅漢草時珍曰秀草秀而不實故字從秀穗形象狗尾故俗集解時珍曰原野垣牆多生之草葉似

實採莖筒盛以治目病惡毒之亂苗即此也

莖至治疔目貴髮穿之即乾滅也凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目瞼以一二莖蘸水盪去惡血甚良時珍

鱧腸

唐本草釋名蓮子草唐本墨蓮草經圖金陵草經圖墨煙草綱目墨頭草綱目墨葉綱目胡孫頭必用猪牙草時珍曰鱧烏頭也其腸亦烏此草柔質斷

如蓮房狀集解恭曰鱧腸生下濕地所在坑渠間多有苗似旋覆二月八月採陰乾頭曰處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而故得蓮名集解光澤莖似馬齒莖高一二尺開花細而白其實若小蓮房蘇恭謂似旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦

作房而圓南人謂之連翹者二種折其苗皆有汁出須臾而黑俗謂之旱蓮子亦謂之金陵草時珍曰旱蓮有二種一種苗似旋覆而花白細者是鱧腸一種花黃紫而結房如蓮房者乃是小蓮翹也爐火家亦用之見連翹條

草氣味甘酸平無毒治血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗眉髮生速而繁唐本烏髮無鬚陰時珍止血排膿通小腸傳一

切瘡并垂癰膏點鼻中添腦附方新九金陵煎益髮髮變白為黑金陵草一秤六月以後收採揀青嫩無泥土者不用洗摘去黃葉白蜜一斤合和日中煎以柳木篲攪勿停手持如稀餚藥乃成矣母日及午後各服一匙以溫酒一盃化烏鬚固齒

下如欲作丸日中再煎令可凡大如梧子每服三十丸及時多合為佳其效甚速孫真人千金月令方烏鬚固齒旱蓮草連根一斤取

無灰酒洗淨青莖四兩淹三宿同汁入油鍋中炒存性研末日用擦牙連津嚥之○又法旱蓮取汁同鹽煉乾研末擦牙○奉親養老書

旱蓮散烏鬚固牙溫尉云納合相公用此方年七十鬚髮不白懇求始得後遇張經始傳分兩也旱蓮草一兩半麻姑餅三兩升麻青鹽

各三兩半訶子連核二十個皂角三挺晚香沙二兩為末薄醋粥糊偏正頭痛鱧腸草汁滴鼻一切眼疾聖濟總錄五月五日平旦合之蓮子草一



握莖葉一握油一斤同浸密封四十九日每日時以  
鐵匙點藥摩頂上四十九過久久其佳 聖濟總錄 擊腎截瘧 旱蓮草搗爛男左女右置寸口上以古文錢壓定常繫佳  
名黑頭草車前草各等分取自然汁 腸風臟毒 下血不止旱蓮子草灰上焙研末 痔漏瘡發 旱蓮草一把連根洗淨用石臼搗如泥  
每空心服三盃愈乃止 醫學正傳 每服二錢米飲下 家藏經驗方 以極熱酒一盞衝入取汁飲之滓傳患處  
重者不過三服即安太僕少卿王鳴鳳患此策杖方 疥瘡惡腫 五月五日收旱蓮草陰乾仍露一夜收過疾時嚼一 風牙疼痛 糊蒜頭草  
能移步服之得瘥累治有驗 劉松石保壽堂方 藥貼上外以消毒膏護之二三日疥脫 聖濟總錄 入鹽少許

於掌心揉擦即止 集玄方

連翹 本經下品校正 用本經翹根 異翹 旱蓮子 樂 蘭華 普 三廉 別錄根名連翹 仲 景竹 根 夔曰連翹亦不翹出眾草太山山谷間甚多

其子折之片片相比如翹應以此得名耳時珍曰按爾雅云連異翹則是本名連又名異翹人因合稱為連翹矣連翹  
亦作連苦即本經下品翹根是也唐蘇恭脩本草退入有名未用中今并為一旱蓮乃小翹人以為體腸者故同名 集解 別錄曰連翹  
八月採陰草引景曰處處有之今用並蓮花實茶巨此物有兩種大翹小翹大翹生下濕地葉狹長如水蘇花黃可愛者子似椿實之未  
開者作房翹出眾草其小翹生岡原之上葉花實皆以大翹而小細山南人並用之今長安惟用大翹子不用蓮花也頌曰今近汴京及  
河中江甯潤澤充鼎岳利諸州南康軍皆有之有大小二種大翹生下濕地或山岡上青葉狹長如榆葉水蘇葉並赤色高三四尺獨  
莖稍間開花黃色秋結實似蓮內作房翹根黃如蒿根八月採房其小翹生岡原之上花葉實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短  
纔高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如果粒亦名旱蓮南人用花葉今南方醫家說云連翹有兩種一種似椿實之未開者較小堅  
而外元無跗莖剖之則中解氣甚芳馥其實纔乾振之皆落不着莖也一種乃如齒莖般柔外有跗莖抱之而無解脈亦無香氣乾之雖  
久著莖不脫此甚相異此種江南下澤間極多如椿實者乃自蜀中 氣味苦平無毒 元素曰性涼味甘氣味俱薄輕而浮升也陽也手搓  
來入用勝似江南者據本草則亦以蜀中為勝錄未見其莖葉也 用之好古曰陰中陽也入手少陽手陽明經又入

珍曰微苦辛 王治寒熱鼠瘻癰腫惡瘡瘰癧結熱毒去白蠟 通利五淋小便不通除心家客熱 通小腸排膿治瘡癰止

痛通月經大 散諸經血結氣聚消腫 旱 瀉心火除脾胃濕熱治下部血證以為使 震 治耳聾渾渾煒煒好

痛通月經大 散諸經血結氣聚消腫 旱 瀉心火除脾胃濕熱治下部血證以為使 震 治耳聾渾渾煒煒好



**莖葉** 治肺積熱 元素曰連翹之用有三漏心經客熱一也去上焦諸熱二也為瘡家聖藥三也果曰十二經病藥中不可無此乃結者散之之義好古曰手足少陽之藥治瘡瘍瘰癧結核有神與紫胡同功但分氣血之異

爾與風枯子同用治瘡瘍別有神功時珍曰連翹狀似人心兩片合成其中有仁甚香乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也諸痛癰瘡瘍皆屬心火故為十二經瘡家聖藥而兼治手足少陽手陽明三經氣分之熱也 附方 舊二瘰癧瘰癧瘰癧等分

為未時時食 項邊馬刀 屬少陽經用連翹二斤配麥一斤大黃三兩甘草半兩每用一兩以水一盞半煎之簡便方 項邊馬刀 七分食後煎服十餘日後灸臨泣穴二七壯六十日決效 張潔古活法機要 瘡瘡腫痛 刀上飛過綠膠入瘡

膏貼之 集驗方

**翹根** 氣味甘寒平有小毒 晉曰神農嘗食甘有毒 李當之苦好古曰苦寒 主治下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老 本經以作燕飲酒病人 別治

傷寒熱飲發黃 時珍曰本經曰翹根生蒿高平澤二月八月採實景曰方藥不用人無識者好古曰此即連翹根也 附方 新瘰癧瘰癧連

單及根各一升水一斗六升 煮汁三升服取汗外臺秘要 也下熱氣故張仲景治傷寒熱在裡麻黃連軀赤小豆湯用之注云即連翹根也

**陸英** 本經 解見 別錄曰陸英生熊耳川谷及寬句立秋採蒸曰此即胡蘆也 古方無胡蘆惟言陸英後人不識浪出胡蘆條此

陸英胡蘆為一物今詳陸英味苦寒無毒胡蘆味酸溫有毒既此不同雖謂一種蓋其類爾字爽曰胡蘆與陸英性味及出產皆不同治

療又別自是一物斷無疑矣 頌曰本草陸英生熊耳川谷及寬句胡蘆不載所出州土但云生田野所在有之春採苗莖有節節間生枝

葉大似水芹春負採葉秋冬採根並陶蘇皆以為一物焉志以性味不同疑非一種亦不能細別但爾雅不謂之華草謂之榮不榮而實

謂之秀榮而不實謂之英此物既有英名當是其花故本經云立秋採正是其花時也 時珍曰陶蘇本草熟地藥性論皆言陸英即胡蘆

必有所據焉志冠宗便雖破其說而無的據 氣味 苦寒無毒 權曰陸英一名胡蘆 王治骨間諸痺四肢拘攣疼痛膝寒痛陰痿短氣不足脚

腫 本經能將風毒脚氣上衝心煩悶絕水氣虛腫風癢皮肌惡痒煎湯入少酒浴之妙 甄權



胡蘆

音胡。別錄曰：胡蘆生田野，春夏採葉，秋冬採莖根。紅景曰：田野墟村甚多，晨旦此蘆英也，刺出別錄下品。名重草，別錄曰：胡蘆生田野，春夏採葉，秋冬採莖根。紅景曰：田野墟村甚多，晨旦此蘆英也，刺出

知所出處，常與胡蘆花白子初青如綠豆，顆每朵如蓋面大。又平生有一二百子，十月方熟，紅時珍曰：每枝五葉，說見陸英下。氣味酸溫有毒，大明曰：苦。主治風癰癰身瘡濕痺，可作浴湯。別錄曰：胡蘆生田野，春夏採葉，秋冬採莖根。紅景曰：田野墟村甚多，晨旦此蘆英也，刺出

癰風痺大

新七

手足偏風 胡蘆葉火燎厚鋪床上，趁熱眠於上，冷復易之。冬月取根，煮碎熬熱用。外臺秘要：風濕冷痺，方同。寒濕腰痛，方同。脚氣腫，和酒醋共三分，根

下合蒸熟封裹腫上，一、二日。運身水腫，坐臥不得，取胡蘆根去皮搗汁，一合。頭風作痛，胡蘆根二升，酒二升，煮

即消亦治不仁，千金方。一兩，枳實炒之，錢三，每服三錢。酒一盞，煎六分服。聖惠方：產後血暈，心悶煩熱，用胡蘆根一握，水一升，煎

金瘡不止，胡蘆一大握，炙令赤，色以水濃煎。一盞，欲發前服。斗門方：卒暴癰塊，堅如石，作痛欲死，取胡蘆根一小束，洗淨細碎，以酒二升，漬三宿，溫服五合，至一

盡再作之。癰腫硬，腫起如盤，眠臥不得，胡蘆根白皮一握，搗汁和水服。千金方：下部閉塞，胡蘆根一把，搗汁水和絞去滓。一切風癰，胡蘆煮湯和少酒塗。聖惠方：上下遊行，至心即死，胡蘆汁洗之，子母秘錄。五色丹毒，胡蘆葉搗敷。惡肉，肉亦去，瘡此藥過十日即不中用也。千金方：手足疣目，胡蘆子揉爛，上

能驚傷人

胡蘆一大把，以水一升，煮須臾，取汁飲，以滓封之。張文仲備急方。

水英

宋圖經：水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

曰：此草不著形狀，氣味無以考證。氣味：主治風濕，強者名骨風，其疾不宜針灸，及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗

及熱浸升林，膝上日夜三四度，不經五日即瘳。數用神驗，其春取苗，夏採葉及花，冬用根，腫甚者加生椒目三升，水二斗，用畢即厚粉，避風忌油膩生菜，猪魚等物。

水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

曰：此草不著形狀，氣味無以考證。氣味：主治風濕，強者名骨風，其疾不宜針灸，及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗

水英

宋圖經：水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

曰：此草不著形狀，氣味無以考證。氣味：主治風濕，強者名骨風，其疾不宜針灸，及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗

及熱浸升林，膝上日夜三四度，不經五日即瘳。數用神驗，其春取苗，夏採葉及花，冬用根，腫甚者加生椒目三升，水二斗，用畢即厚粉，避風忌油膩生菜，猪魚等物。

水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

曰：此草不著形狀，氣味無以考證。氣味：主治風濕，強者名骨風，其疾不宜針灸，及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗

及熱浸升林，膝上日夜三四度，不經五日即瘳。數用神驗，其春取苗，夏採葉及花，冬用根，腫甚者加生椒目三升，水二斗，用畢即厚粉，避風忌油膩生菜，猪魚等物。

水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

水英

宋圖經：水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

曰：此草不著形狀，氣味無以考證。氣味：主治風濕，強者名骨風，其疾不宜針灸，及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗

及熱浸升林，膝上日夜三四度，不經五日即瘳。數用神驗，其春取苗，夏採葉及花，冬用根，腫甚者加生椒目三升，水二斗，用畢即厚粉，避風忌油膩生菜，猪魚等物。

水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

曰：此草不著形狀，氣味無以考證。氣味：主治風濕，強者名骨風，其疾不宜針灸，及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗

及熱浸升林，膝上日夜三四度，不經五日即瘳。數用神驗，其春取苗，夏採葉及花，冬用根，腫甚者加生椒目三升，水二斗，用畢即厚粉，避風忌油膩生菜，猪魚等物。

水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

水英

宋圖經：水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

曰：此草不著形狀，氣味無以考證。氣味：主治風濕，強者名骨風，其疾不宜針灸，及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗

及熱浸升林，膝上日夜三四度，不經五日即瘳。數用神驗，其春取苗，夏採葉及花，冬用根，腫甚者加生椒目三升，水二斗，用畢即厚粉，避風忌油膩生菜，猪魚等物。

水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

曰：此草不著形狀，氣味無以考證。氣味：主治風濕，強者名骨風，其疾不宜針灸，及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗

及熱浸升林，膝上日夜三四度，不經五日即瘳。數用神驗，其春取苗，夏採葉及花，冬用根，腫甚者加生椒目三升，水二斗，用畢即厚粉，避風忌油膩生菜，猪魚等物。

水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

水英

宋圖經：水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

曰：此草不著形狀，氣味無以考證。氣味：主治風濕，強者名骨風，其疾不宜針灸，及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗

及熱浸升林，膝上日夜三四度，不經五日即瘳。數用神驗，其春取苗，夏採葉及花，冬用根，腫甚者加生椒目三升，水二斗，用畢即厚粉，避風忌油膩生菜，猪魚等物。

水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼

曰：此草不著形狀，氣味無以考證。氣味：主治風濕，強者名骨風，其疾不宜針灸，及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗

及熱浸升林，膝上日夜三四度，不經五日即瘳。數用神驗，其春取苗，夏採葉及花，冬用根，腫甚者加生椒目三升，水二斗，用畢即厚粉，避風忌油膩生菜，猪魚等物。

水英，唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛紅草。河北信都人名水節，河內連肉黃呼



藍

本經名時珍曰按陸佃理雅云月令仲夏令民無刈藍以染鄭玄言集注別錄曰藍生河內平澤其莖青可以染青於景曰此即今上品名或傷長養之氣也然則刈藍先王有禁制字從監以此故也集注別錄曰藍生河內平澤其莖青可以染青於景曰此即今

二寸許厚三四分者堪染青出嶺南太常名為木藍子陶氏所說乃是松藍其汁拌為澱其青者本經所用乃是葉藍實也其苗似葉而味不辛為澱惟作碧色爾頃白藍處處有之人家蔬園作畦種至三月四月生苗高二三尺許葉似水菜花紅白色實亦若麥子而大黑

色五月六月未實但可染碧不堪作澱此名葉藍即醫方所用者也別有木藍出嶺南不入藥有松藍可為澱亦名馬藍爾雅所謂蠶馬藍是也又楊州一種馬藍四時俱有葉類苦實紫土人連根採服治敗血江實一種葉藍二月內生如蒿葉青花白亦解熱毒此二種雖

不類而俱有藍名且古方多用吳藍或恐是此故并附之索隱曰藍實即大藍實也謂之葉藍者非是乃爾雅所謂馬藍者解諸藥毒不可調也實與葉兩用註不解實只解葉為未盡時珍曰藍凡五種各有主治惟藍實專取葉藍者葉藍如葉五六月開花成穗細小

紅色子亦如葉歲可三刈故先王禁之松藍葉如白松馬藍葉如苦實即郭璞所謂大葉冬藍俗中所謂板藍者二藍花子並如葉藍吳藍長莖如蒿而花白吳人種之木藍長莖如決明高者三四尺分枝布葉葉如槐葉七月開淡紅花結箇長寸許葉如小豆苗其子亦

如馬蹄決明子而微小迴與諸藍不同而作澱則一也別有甘藍可食見本條蘇恭以馬藍為木藍蘇頌以松藍為馬藍宗秉以藍實為大葉藍之實皆非矣今並開列于下

藍實氣味苦寒無毒

權曰甘主治解諸毒殺蟲蛇疰鬼驚毒及服頭不白輕身本經曰蛟音其小兒鬼也填骨髓明目利五臟調六腑通關節治

經絡中結氣使人健少睡益心力

甄權療毒腫蘇恭

藍葉汁

此葉藍也氣味苦甘寒無毒主治殺百藥毒解狼毒射罔毒別錄曰景曰解毒不得生藍汁以青布漬汁亦善汁塗五心止煩悶療蜂螫毒引證發元景

青樓雞毒砂砒石毒

時珍

馬藍

治婦人敗血連根煨搗下節酒服一錢七蘇恭

吳藍氣味苦甘冷無毒主治寒熱頭痛赤眼天行熱狂下瘡遊風熱毒腫毒風癰除煩止渴殺疳解毒藥毒前金瘡血閉毒刺虫蛇



傷鼻衄吐血排膿後血運小兒壯熱解金石藥毒射周毒

藍者也至于用澱與青布則是則藍浸水入石灰澄成者性味不能不少異不可與藍汁一舉論也

汁入口即定蓋亦取其殺虫降火爾如此之類不可不知頃日藍汁治中多傷劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一盃入雄黃屑香二

物少許以點吹處仍細服其汁神異之極也張薦賢外往劍南張延實判官忽被斑蜘蛛咬頭上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上

從胸前下至心經兩宿頭面腫疼大如數升益壯漸腫幾至不救張公出錢五百千并薦家財又數百十算能瘡者忽一人應召云可治

張公真不信之欲驗其方其人云不請方但瘡人性命爾遂取大藍汁一盃以蜘蛛投之至汁而死又

取藍汁如腐者雄黃更以一蛛投入隨化為水張公因異之遂令點於咬處兩日悉平作小瘡而愈

服子小兒中藍下血欲死搗青藍陰陽易病傷寒初愈定合陰陽必病拘急手足拳小腹急顫頭不能舉名陰陽易

母秘錄小兒中藍下血欲死搗青藍陰陽易病傷寒初愈定合陰陽必病拘急手足拳小腹急顫頭不能舉名陰陽易

分高禾水調傳上氣欬嗽呻吟息氣喉中作聲嚔粘以藍葉水浸搗汁一升空腹頻服須臾以杏

頭上聖惠方上氣欬嗽呻吟息氣喉中作聲嚔粘以藍葉水浸搗汁一升空腹頻服須臾以杏

前二升去滓溫洗令即再腹中驚癇藍葉一升搗以水三升絞應聲虫病腹中有物作聲隨人語言名應聲虫病用

暖以度為度聖濟總錄腹中驚癇藍葉一升搗以水三升絞應聲虫病腹中有物作聲隨人語言名應聲虫病用

後方服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死卒自縊死以藍汁灌毒箭傷人藍青搗飲并傳之如無藍

金方齒痛腫痛紫藍燒灰敷之日白頭禿瘡洗聖濟錄天泡熱瘡良集簡方瘡疹不快板藍根一兩甘草一

錢氏小兒方至千下澄去水則青黑色亦可乾收用染青碧其攪劉浮沫探出陰乾謂之龍花即見下

藍澱目釋名時珍白澱石澱也其澤澄澱在下也亦作浞俗作靛南人掘地作坑以藍浸水一宿入風攪

毒傳熱瘡小兒禿瘡熱腫膿止血殺虫治噎膈時珍白澱乃藍與石灰作成其氣味與藍稍有不同而其止血拔毒殺虫之功似







研不新汲水服二附錄在類別錄有名未用曰味鹹益氣明目生藍中葉細黃莖亦有錢古今錄驗

甘藍

指自菜部

甘藍指自菜部種名藍菜種多食之漢地少有其葉長大而厚煮食甘美經冬不死春亦有英其花黃生角結子其功與藍

相近氣味甘平無毒治食大營填髓利五臟六腑利關節通經絡結氣心下結伏氣明目健人少睡益心力壯筋骨作道

經宿色黃和鹽食治毒藏

子多睡思

蓼

本經中品移入此

時珍曰蓼類皆高揚故

集解別錄曰蓼實生雷澤川澤弘景曰此類多人所食有三種一是青蓼人家常用其葉

不甚辛好食保胃曰蓼類其多有青蓼香蓼水蓼馬薊紫蓼赤蓼木蓼七種紫赤二葉葉小狹而厚青香二葉葉亦相侶而俱導馬水二薊葉俱潤大上有黑點水蓼一名天蓼蔓生葉侶柘葉六葉花皆紅白子皆大如胡麻亦黑而共扁惟木蓼花黃白子皮青滑諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生可為生菜須曰木蓼亦有大小二種皆蔓生陶氏以青蓼入藥餘亦無用三茅君傳有作白蓼醬方藥譜無白蓼疑即青蓼也常服曰蓼實即蓼部下品水蓼之子也彼言水蓼是用此言蓼實是用子也春初以壺盧盛水浸濕高挂火上日夜使暖遂生紅芽取為蔬以備五辛盤時珍曰韓保昇所說甚明古人種蓼為蔬收子入藥故禮記烹雞豚魚蟹皆實蓼于其腹中而和羹膾亦須切蓼也後世飲食不用人亦不復裁惟造酒麴者用其汁耳今但以平澤所生香蓼青蓼紫蓼為良

實氣味辛溫無毒

種多食吐水壺氣損陽

主治明目溫中耐風寒下水氣面浮腫瘡癰

本經歸鼻除腎氣去癰瘍止霍亂治小兒頭瘡附方舊一

傷寒發復

因交後即腫或縮入腹痛

霍亂煩渴

服二錢水煎服

聖惠

小兒頭瘡

藥性論

蝸牛咬毒毒行偏身者麥子可

水浸之立愈不可近陰

陳藏器本草



苗葉氣味辛溫無毒

通曰黃帝云食麥過多有毒發心痛和生魚食令人脫氣陰核痛求死二月食麥傷人 主治歸舌除大小腸

邪氣利中惡

別乾之釀酒主風冷大良 弘 主作生菜食能入腰脚煮湯將脚治霍亂轉筋煮汁日飲治瘰癧搗爛傳狐尿瘡

熬燒灰淋汁浸之以桑葉善立愈

明殺虫伏碗時 新三 麥汁酒 治胃脘冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬卧足冷八月三日

酒法待熟日飲之十日肝虛轉筋

吐瀉赤麥葉切三合水一盞酒 聖惠方 霍亂轉筋 麥葉一升水三升煮取汁二升入香豉

後目明氣壯也千金方

三合煎至四合分二服 聖惠方 霍亂轉筋 麥葉一升水三升煮取汁二升入香豉

水蓼

唐本經名虞蓼爾雅澤蓼曰生干淺水澤中故名水蓼時珍曰水蓼生下濕水旁葉似馬蓼大于家蓼葉赤色水浸食之

水浸汁和麴作餅亦取其辛耳時珍曰此乃水際所生之蓼葉長五六寸比水

莖葉稍狹比家蓼葉稍大而功用彷彿故寇氏謂蓼實即水蓼之子者以此故

主治蛇傷傷傳之絞汁服之止蛇毒入腹心悶又治脚氣腫痛成瘡水煮汁漬之

馬蓼

綱目名大蓼時珍曰凡物大者皆以馬名之俗呼大蓼是也高四五尺有大

也紅

莖葉氣味辛溫無毒

時珍曰大 主治去腸中蛭虫輕身

紅草

別錄中品校正 併入有名未 經名鴻鵠音 游龍詩 石龍別 天蓼別 時珍曰此蓼其大而花亦繁紅故曰紅曰鴻鵠亦大也

草部



藏器解云天蓼即水荭一名游龍一名大蓼據此則二條乃一指其實一指莖葉而言也今并為一錄曰紅生水旁如馬蓼而大五六月採實紅景曰今生下濕地其蔓極似馬蓼而甚長大詩稱濕有游龍郭璞云即龍占也須白紅即水荭也似蓼而葉大赤白色高餘節雖云紅龍古其大者歸書說陸機云游龍一名馬蓼然馬蓼自是一種也時珍曰其莖粗如梅指有毛其葉大如商陸葉色淺紅成穗秋深子成扁如酸棗仁而小其色赤黑而肉白不甚辛快燭可食

**實氣味鹹微寒無毒**主治消渴去熱明目益氣別方舊一瘰癧水荭子不以多少一半微炒一半生用同研末食後好酒調服瘰癧瘡

腹脹及堅硬如盃盤者用水荭子一升另研細篩三十箇去皮新向膠一箇皮清四兩石臼搗爛攤在患處上用油紙以長帛束之西時貼之次日辰時取之未效再貼二三次倘有膿潰勿怪仍看虛實日逐間服錢氏白餅子紫霜丸壅氣凡消積利之唐之服至半月甚者一月無不瘥矣以喘滿者為實不喘者為虛關氏經驗方

**花主散血消積止痛**時珍附方新胃脫血氣作痛水荭花一大撮水二鍾煎一鍾服百氣痞痛水荭花為末熱酒服二錢又法男用酒水各半煎服女用醋水各半煎服

一婦年三十病此腹中痞積水荭花或子一盞以水三盞用桑葉文武煎成膏量痞大小服立效摘玄方腹中痞積水荭花或子一盞以水三盞用桑葉文武煎成膏量痞大小服立效摘玄方

**理氣根莖降痰瘧腫水氣脚氣煮濃汁漬之**新生肌肉水荭花根煎湯淋洗仍以其葉晒乾研末撒瘡上每月一次談笑翁試驗方

**毛蓼**拾藏器曰毛蓼生山足似馬蓼葉上有毛冬根不死

**莖葉氣味辛溫有毒**主治癰腫疽瘰癧瘡碎納瘡中引膿血生肌亦作湯洗煎濯足治脚氣藏器

**海根**拾集解藏器曰生會稽海畔山谷莖赤葉似馬

根氣味苦小溫無毒主治霍亂中惡心腹痛鬼氣瘧忤飛尸喉痺蟲毒癰疽惡腫赤白遊蛇咬大毒酒及水磨服并傳之



藏器

# 火炭母草

字圖 蘇頌曰生惠州原野中莖赤而柔似細葉葉端尖近  
經 蘇頌曰生惠州原野中莖赤而柔似細葉葉端尖近  
藥材方夏有白化秋實如椒青黑色味甘可食

# 葉氣味酸平有毒

治去皮膚風熱流注骨節癰腫痠痛不拘時采於地中搗爛以鹽酒炒傳腫痛處經宿一易之

# 三白草

唐本經 三白草生池澤畔高尺許葉似水荭亦似蕺又似拔葉草上有三黑點非白也古人  
藥材方夏有白化秋實如椒青黑色味甘可食

農人候之許田三葉白則草便秀故謂之三白若云三黑點蘇未識矣其葉如薯蕷亦不似水荭草耳曰今出襄州二月八月采根用時  
珍曰三白草生田澤畔八月生苗高三二尺莖如葉葉如韋陸及青箱四月其顛三葉面上三三小變作白色餘葉仍青不變俗云一葉白  
食小麥二葉白食梅杏三葉白食李子五月開紫成穗如梨花狀而色白散香結細實根長白虛軟有節積狀如泥葛蒲根  
造化指南云五月採花及根可制雜黃蘇春言似水紅有三黑點者乃真草非三白也藏器所說雖是但葉亦不似薯蕷

有小毒治水腫脚氣利大小便消瘰癧積聚消腫本搗絞汁服令人吐逆除瘧及胸膈熱痰小兒瘡滿根癢脚氣風毒腫

搗酒服亦甚有驗又煎湯洗瘡

# 蠶繭草

拾遺錄 蠶繭草生濕地如蓼大  
氣味辛平無毒治諸虫如蠶類咬人恐毒入腹煮服之亦搗傳諸瘡

# 蛇蘭草

拾遺錄 蛇蘭草生平地葉似苦枝而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似芋亦傳蛇毒微曰  
氣味 主治蛇虺毒

聖賢取根葉搗傳咬處當下黃水

# 虎杖

列傳 虎杖名苦杖拾遺錄注文曰虎杖時珍曰杖言其莖虎言其斑也或云一名杜牛  
中品藥名苦杖性平味甘華齒才勝者非也一種斑杖似蒲頭者與此同名異物集解而葉圓得異曰所在有之生下濕地



本草綱目 卷十九

作樹高天餘其莖赤根黃二月三月採根日乾今出汾州越州滁州處處有之三月生苗莖如竹筍狀上有赤斑點初生便分枝子葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無皮色破開即黃似柳根亦有高天餘者爾雅云桑虎枝郭璞注云似莊草而粗大有細刺可以染赤是也藥曰此草藥也爾雅云木高天餘者非矣大率皆似寒菊葉花葉莖葉差大高異仍莖葉有淺黑斑六七月旋旋開花至九月中方花片四出其色如桃花差大而外微深溪西山麓水次甚多數曰凡使勿誤用天藍及斑袖根二味根形味皆相似也撰曰諸法或云似莊似否似寒菊各不相侔豈所產有不同耶詳珍曰其莖似莊草其葉圓似否其枝黃似柳其花狀似菊色似桃花合而觀之未嘗不同也

**根脩治**藥曰採得細剉却用氣味微溫性平無毒藥曰味甘平無毒藥曰味微苦今天下暑月多煎根汁為飲不得甘章包一夜曬乾用草則不堪飲本文不言味藥性論云甘是甘草之味非虎杖味也主治通利月水破留血癥

**結錄**漬酒服主暴癰風在骨節間及血瘀者作酒服之藥曰治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒癰腫治產後血暈惡血不下心腹脹滿

**排膿主癰癰損瘀血破風毒結氣**明燒灰貼諸惡瘡焙研煉蜜為丸陳米飲服治腸痔下血研末酒服治產後瘀血痛及墮撲脊

**問有效**時珍曰暑月以根和甘草同煎飲色如琥珀可愛甚甘美類置井中令冷散如冰時人呼為冷飲子服之且專於若極解

內積聚虛脹雷鳴四肢沈重亦治丈夫積聚有虎杖根取高地虎杖根剉二斛水二石五斗煮取一斗半去滓入酢酒五升煎如餲每服一合以知為度又許學士本事方治男婦諸般淋疾用苦杖根洗淨剉一合以水五合煎一盞去滓入乳香屑膏少許服之即歸耐歇夢

得內人患沙石淋已十三年每漩痛楚不可忍溺器中小便下沙附方甚三小便五淋苦杖為末每服二錢石剉利有聲百方不效偶得此方服之一夕而愈乃手自擊者附方新三小便五淋用飯飲下集驗方月水不利虎杖三兩浸膏花

酒每服一錢○又方治月經不通腹大如瓠氣短欲死虎杖一斤去頭暴乾切上瓜根汁牛膝汁二斗水一斛浸虎杖一宿煎取二斗入二汁同煎如餲酒服一合日再夜一宿血當下聖惠方時疫流毒攻手足腫痛欲斷用虎杖

腹中暴癰硬如石痛刺不治百日內死取虎杖根勿令影顯水上可得石餘洗乾搗末米五升炊飯納入攪之好酒五斗漬之封候藥酒飯浮可飲一升半勿食鮭魚及鹽但取一斗乾者薄浸飯從少起日三服亦佳癰當下也此方治癰大勝諸藥也外臺秘

要氣存怪病人忽偏身皮底流注如波浪聲痒不可忍狐之血出不能解謂之氣瘕以酒瀉引飲虎杖燒過海浮石黑賊魚骨丹砂等分苦枝人參青鹽細辛各一兩作一服水煎細飲盡便愈夏子益弄疾方為末湯時以客門久湯服二錢日三次







蓋草

音爐○本經下品

釋名蓋草

晉華

唐華

蓋草

王霸

時珍曰此草綠色可染黃故曰黃曰綠也蓋乃北人呼綠

臣也詩云終朝採綠不盈一掬許慎說文云蓋草可以染黃漢書云諸侯盤饗晉灼注云蓋草出鄆郡似艾可

染因以名綫皆謂此草也蓋錫曰爾雅王霸孫炎注云即華草也今呼為蓋草詩云蓋草生青衣

以染作金色蓋曰王太山山谷本曰青衣縣名在益州今處處平澤溪澗則

皆有葉似竹而細薄莖亦圓小令刺夏人煮以染黃色極鮮好俗名華草

氣味苦平無毒

權曰神農雷公皆云

驚悸瘡疥白瘡癰殺皮膚小虫

治身熱邪氣小兒身熱

普洗一切惡瘡有效

明

疾禁

本經要藥

爾雅

通人

行

休

升

推

履

今軍家乃鐫鐵作之以布敵路名鐵蓋禁易云據于疾聲言其山傷詩云

有疾不可掃也以刺梗織方用其種時珍曰疾禁也禁利也

疾禁也其刺傷人其疾而利也屈人止行皆因其傷人也

集解錄曰疾禁子生馮州平澤或道旁七月八月採實暴乾頃曰冬月亦

種白疾禁今生同州少充牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可

採其實味甘而微腥褐綠色與蚕種子相類而差大又與馬藻子酷相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之

子

治

再蒸從午至酉日乾用大明日入藥不計丸散並妙去利用

氣味苦溫無毒

列錄曰去微溫權曰甘有小毒

服不冷而無毒熱當以性溫為是

之才曰為頭為

之

使

治

諸風癰瘡瘰癧吐膿去燥熱

治奔豚腎氣肺氣胸膈滿催生胎胎益精瘰癧水藏冷小便多止遺泄精溺血腫痛

明痔漏陰汗婦人發

治諸風癰瘡瘰癧吐膿去燥熱

治奔豚腎氣肺氣胸膈滿催生胎胎益精瘰癧水藏冷小便多止遺泄精溺血腫痛



乳帶下風治風秘及蚊虫腹痛

白茯苓氣味甘溫無毒治腰膝痛泄精虛損之

頭目眩古方皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單服茯苓

皆用刺者後世補腎多用沙苑藟或以其膏和藥服其功

亦不甚相遠也刺者炒黃去刺是虧作新或食可以散其

一年以後冬不寒實不熱二年老若復少髮白髮

黑齒落更生服之三年身輕長生神仙秘旨腰膝痛

末蜜和丸胡豆大每服二錢大便風秘

下及胎死者婦人自母各四兩為末

三十年失調補肝散用茯苓子七月七日收乾

白茯苓不旦打動牙痛

面上癰瘰

花王治諸病不每溫酒服二三錢治白癰風

苗王治諸病不每溫酒服二三錢治白癰風



穀精草

宋

種名

穀精草

時珍曰

穀精草所生故曰穀精

集解

頃曰處處有之春生於穀田中葉似青根花

馬今肥主虫蠶毛為病久有一種其根似赤出春間時珍曰此草收穀後荒田中生之江湖南北多

花氣

溫無毒

可結水銀成砂子

主治喉痺齒痛風諸瘡疥

時珍曰此草精體性平

目中諸病而用之甚佳明日

附方

一腦痛瘡痛

用半錢燒煙筒中隨左右熏鼻

聖濟錄

偏正頭痛

集解方用穀精草一兩為末以

換○聖濟方用穀精草末銅絲

各一錢硝石半分隨左右

鼻服二錢

聖惠方

早醫膜

穀精草防風等分為末

飲服之

明目方

痘後目

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

日食之又方見夜明沙

部真人潘意方

小兒痘

至晚忽不見物用錫年

一且不用水洗竹刀

剖開入穀精草一撮

牙調食熱日食

之厚效

忌口

忌口

忌口

忌口

忌口

忌口

忌口

忌口

小兒

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

吐

海金沙

宋

種名

海金沙

時珍曰

其色黃如細沙也謂之海

集解

高錕曰出點中郡湖南亦有生

小株高一二尺七月收其金

於日中晞之小乾以紙襯承

以杖擊之有細沙落紙上

且暴且擊

以書為度時珍曰江浙湖

川及宜有之生山林下

葉細如繡引千竹木上

高尺許其葉細如繡引

千竹木上高尺許其葉

細如繡引千竹木上

高尺許其葉細如繡

青上多數文皺處有沙子

狀如蒲黃粉黃赤色不

開花細根堅強其沙及

草皆可入藥方士采其

草取其草取汁煮砂質

氣味甘寒無毒主

治通利小腸得厄子馬

消通沙瘵傷寒熱狂或

丸散散治濕熱腫滿小

便淋瀝淋血淋石淋

痛解熱毒氣

時珍曰海金

沙小腸時

時珍曰海金

沙小腸時

時珍曰海金

血分

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

經血

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

本草

膏

淋

如

油

服

二

錢

參

湯

服

二

錢

參

湯

服

二

錢

參



金沙三錢白木四兩甘草半兩黑牽牛頭末一兩半為末  
每服一錢煎水調下得利為妙  
東垣蘭室秘藏  
瘡癤變黃  
歸賢用此園家草煎酒傳  
其身即發起  
直指方

地楊梅

通  
地楊梅  
俗名楊梅  
時珍曰生江東濕地苗如沙  
草四五月有子似楊梅也  
**氣味辛平無毒**  
**主治赤白痢取葉子煎湯服**  
藏器

水楊梅

綱目  
水楊梅  
俗名楊梅  
時珍曰生水邊條葉甚多生子如楊梅狀庚辛玉冊云地椒一名水楊梅多生近道陰濕處  
田中亦有之葉生苗葉似菊莖端開黃花實類椒而不亦實可結伏三黃白磨制丹砂粉霜  
**氣味辛溫無**

臺瘡癰腫毒

地蜈蚣草

綱目  
地蜈蚣草  
俗名蜈蚣草  
時珍曰生村落野間左蔓延右有草延左其葉密而對生如蜈蚣  
形其穗亦長俗呼過路蜈蚣其延上樹者呼飛天蜈蚣根苗皆可用  
**氣味苦寒無毒**  
**主治解諸毒及大便不通搗**

汁瘡癰腫搗碎末服能消腫排膿蜈蚣傷者入鹽少許搗塗或末傳之  
時珍  
**附方**  
一切癰疽  
及腸癰奶癰亦腫未破或已破而膿血不  
散發熱疼痛能食者並宜排膿托裏散用

地蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分為末  
每服二錢溫酒下  
和劑局方

半邊蓮

綱目  
半邊蓮  
俗名半邊蓮  
時珍曰半邊蓮小草也生陰濕處蔓連就地細梗引蔓節節而生  
細葉秋開小花淺紅紫色止有半邊如蓮花狀故名又呼急解索  
**氣味辛平無毒**  
**主治蛇虺傷搗汁飲以澤蘭葉又**

漢氣喘及瘧疾寒熱同雄黃各二錢搗泥罈內覆之待色青以飯丸梧子大每服九丸空心鹽湯下  
時珍  
**附方**  
毒域方

紫花地丁

綱目  
紫花地丁  
俗名紫花地丁  
時珍曰處處有之其葉似柳而微細夏開紫花結角平地生者起莖  
倒垂葉微似木香花之葉此  
與紫花者相戾恐別一種也  
**氣味苦辛寒無毒**  
**主治一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡**  
時珍  
**附方**  
新  
黃痘內熱  
錢  
乾坤秘韞  
利  
芒

倒垂葉微似木香花之葉此  
與紫花者相戾恐別一種也  
**氣味苦辛寒無毒**  
**主治一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡**  
時珍  
**附方**  
新  
黃痘內熱  
錢  
乾坤秘韞  
利  
芒

粘咽不得出者箭頭草  
酒一鍾攪汁服  
楊誠經驗方  
癰疽發背  
無名諸腫貼之如神紫花地丁草三伏時收以白鰯和  
成鹽醋浸一夜貼之昔有一尼發背得此方數日而



瘡孫天一切惡瘡紫花地丁根日乾以錐或燒煙對瘡瘰癧瘰癧瘡發背諸腫紫花地丁根去粗皮同白瘡腫千金方用紫花地丁

效楊氏方用紫花地丁草蔥頭生喉痺腫痛箭頭草葉入醬少許研蜜其搗貼之若瘰癧加新黑牛屎膏點入取吐普濟方

鬼針草

拾遺釋鐵器曰生池畔方莖葉有極子作釵脚著氣味苦平無毒治蜘蛛蛇咬疥汗服併傳藏珍附方新割甲傷

肉不食鬼針草苗鼠粘子根搗汁和臘猪脂塗千金

獨用將軍

唐本草集解蒸曰生林野中節節穿葉心生氣味辛無毒治毒腫乳癰解毒破惡血附方新下刺禁口獨將軍草根有

搗汁三匙以白酒半孟和服簡便方附錄留軍待恭曰生劍州山谷葉似楠而細長米無時味

見腫消

宋圖經集解頌曰生筠州春生苗莖葉紫色色高一氣味酸澀有微毒治消癰腫及狗咬搗葉貼之蘇頌附方新一切腫毒及傷

毒發於耳之前後及項下腫硬用見腫消草生白及生白斂土大黃生大薊根野苧麻根搗成餅入芒硝一錢和貼留頭乾即易之若加金線重縛及山慈姑尤妙傷寒蘊要


攀倒甑

圖經集解頌曰生宜州郊野莖葉如薄荷一名斑枝一名接骨時氣味苦寒無毒治解利風熱煩渴狂躁搗汁服甚效頌

水甘草

圖經集解頌曰生筠州多在水旁春生苗莖青葉如氣味甘寒無毒治小兒風熱丹毒同甘草煎飲蘇頌







L6931p  
1883  
v. 15-16